

Informatii colectie:

1. Intrebarea nr. 1: I1 **Capitol:** angina **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10
Timp pe intrebare: 0 sec **Autor:** n

Agentul etiologic in herpangina este :

- a) CMV
- b) HIV
- c) toxoplasma gondii
- d) virusul ECHO, Coxsackie
- e) EBV

2. Intrebarea nr. 2: I3 **Capitol:** angina **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10
Timp pe intrebare: 0 sec **Autor:** n

Afectiunile metatonzilare in amigdalita streptococica sunt :

- a) paratonzilita
- b) glomerulonefrita
- c) reumatismul
- d) miocardita
- e) pielonefrita

3. Intrebarea nr. 3: I4 **Capitol:** angina **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10
Timp pe intrebare: 0 sec **Autor:** n

Care pot fi agentii patogeni ai amigdalitelor:

- a) Meningococul
- b) Francisella tularensis
- c) Corynebacterium diphtheriae
- d) Pneumococul
- e) Streptococcus B-hemolitic din grupul A

4. Intrebarea nr. 4: I5 **Capitol:** angina **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10
Timp pe intrebare: 0 sec **Autor:** n

Amigdalita Plaut-Vincent se caracterizeaza prin urmatoarele afectari:

- a) ulceronecrotica
- b) unilaterala
- c) febra tip hectic
- d) subfebrilitate
- e) dureri violente

5. Intrebarea nr. 5: I6 **Capitol:** angina **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10
Timp pe intrebare: 0 sec **Autor:** n

Pentru amigdalita streptococica sunt caracteristice :

- a) dureri la deglutitie
- b) trismus
- c) adenopatii regionale
- d) depuneri purulente
- e) ulceratii unilaterale

6. Intrebarea nr. 6: I369 **Capitol:** angina **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10
Timp pe intrebare: 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Angina primaracel mai frecvent este provocata de:

- a) meningococ
- b) pneumococ
- c) streptococ
- d) salmonella
- e) toxoplasma gondii

7. Intrebarea nr. 7: I370 **Capitol:** angina **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Care este modificarea hemoleucogramei in angina streptococica:

- a) monocitoza
- b) leucocitoza
- c) aneozenofilie
- d) limfocitoza
- e) leucopenie

8. Intrebarea nr. 8: I371 **Capitol:** angina **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Care sunt agentii patogeni ce pot provoca angina:

- a) Epstein-Barr
- b) meningococ
- c) corynebacterium diphtheriae
- d) pneumococ
- e) streptococul beta-hemolitic

9. Intrebarea nr. 9: I372 **Capitol:** angina **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Angina tularmica se caracterizeaza prin:

- a) afectarea unilaterala
- b) afectarea bilaterala
- c) angina necrotica
- d) depuneri purulente
- e) depuneri cenusii

10. Intrebarea nr. 10: I373 **Capitol:** angina **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Manifestarile clinice ale anginei Duguet(Febra Tifoida):

- a) afectarea unilaterala
- b) afectarea bilaterala
- c) modificari necrotice
- d) depuneri purulente
- e) febra septica

11. Intrebarea nr. 11: I374 **Capitol:** angina **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Manifestari in herpangina:

- a) vezicule
- b) ulceratii
- c) afectarea unilaterala
- d) afectarea bilaterala
- e) depuneri purulente

12. Intrebarea nr. 12: I531 **Capitol:** angina **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Herpangina este determinata de virusul:

- a) CMV
- b) HSV-1
- c) HSV-2
- d) Varicelo-zosterian
- e) ECHO,Coxackie

13. Intrebarea nr. 13: I7 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru forma cutanata de antrax fara complicatii este caracteristic:

- a) eruptie maculo-veziculoasa generalizata
- b) eruptie maculo-papuloasa
- c) carbuncul nedureros
- d) eritem raspandit cu margini bine delimitate, dureros
- e) ulceratie dureroasa

14. Intrebarea nr. 14: I8 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru antraxul cutanat este caracteristic semnul clinic :

- a) vezicole cu continut purulent
- b) dureri pronuntate in ulcerul carbonos
- c) edem raspandit, gelatinos in jurul crustei
- d) limfadenopatia generalizata
- e) edem dureros cu semne de fluctuatie

15. Intrebarea nr. 15: I9 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Cea mai frecventa forma in antraxul cutanat este :

- a) edemul malign
- b) carbunculoasa
- c) buloasa
- d) erizipeloida
- e) ulcero-bubonica

16. Intrebarea nr. 16: I10 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In favoarea carbuncului cutanat in antrax pledeaza :

- a) trombovasculita hemoragica
- b) dureri locale pulsative
- c) crusta neagra cu vezicule fiice
- d) lipsa edemului
- e) prezenta veziculelor cu continut purulent

17. Intrebarea nr. 17: I11 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Procesul inflamator in antrax are caracter :

- a) fibrinos
- b) proliferativ
- c) proliferativ-productiv
- d) purulent
- e) sero-hemoragic

18. Intrebarea nr. 18: I12 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce material biologic se investigeaza pentru confirmarea antraxului cutanat ?

- a) exudatul din vezicule
- b) urina
- c) masele vomitive
- d) bila
- e) mase fecale

19. Intrebarea nr. 19: I13 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ulcerul carbunos cutanat in antrax mai frecvent se localizeaza pe :

- a) degete la maini
- b) antebrate
- c) fata
- d) spate
- e) fese

20. Intrebarea nr. 20: I14 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru antrax sunt caracteristice:

- a) pronosticul in formele cutanate de antrax actualmente este favorabil
- b) dureri exprimate la poarta de intrare
- c) forma cea mai raspandita este varianta carbunoasa
- d) marirea ganglionilor limfatici mediastinali in formele pulmonare
- e) limfadenopatie generalizata in forma cutanata

21. Intrebarea nr. 21: I15 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In tratamentul formei semigrave de antrax cutanat se vor utiliza :

- a) antibioticoterapia
- b) terapia de rehidratare
- c) terapia de detoxicare
- d) imunoglobulinoterapia
- e) terapia locala cu unguent

22. Intrebarea nr. 22: I16 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Antraxul generalizat se confirma bacteriologic prin investigatia materialelor :

- a) sangelui
- b) sputei
- c) materiilor fecale
- d) salivei

e) spermei

23. Intrebarea nr. 23: I17 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Diagnosticul de antrax se confirma prin metodele :

a) bacterioscopice

b) bacteriologice

c) biochimice

d) biologice

e) radiologice

24. Intrebarea nr. 24: I18 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Forma generalizata de antrax necesita diferentierea cu :

a) pneumonie

b) ularemie

c) pesta

d) hepatita virala B

e) dizenteria

25. Intrebarea nr. 25: I19 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Formele clinice in antrax sunt :

a) anginoasa

b) cutanata

c) nefrotica

d) pulmonara

e) septica

26. Intrebarea nr. 26: I521 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniu

Carbunele in antrax se caracterizeaza prin :

a) crusta neagra

b) descuamatia tegumentara

c) o fisie galbena- purulenta

d) valul purpuriu cu vezicule fiice

e) exantem hemoragic pe corp

27. Intrebarea nr. 27: I522 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniu

Care sunt formele clinice in antrax:

a) cutanata

b) septica secundara

c) septica primara

d) bubonica

e) oculoglandulara

28. Intrebarea nr. 28: I523 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniu

Forma septicemica carbunoasa primara se caracterizeaza:

a) o complicatie la cea cutanata

- b) lipsesc modificarile locale
- c) sindromul hemoragic pronuntat
- d) sindromul toxic pronuntat
- e) nu este afectat tractul gastrointestinal si respirator

29. Intrebarea nr. 29: I524 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Forma septicemica carbunoasa secundara se caracterizeaza prin:

- a) lipsa crustei negre
- b) prezenta modificarilor cutanate locale
- c) afectarea meningeilor
- d) afectarea pulmonilor
- e) afectarea oculara

30. Intrebarea nr. 30: I525 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Edemul malign in antrax este :

- a) elastic
- b) gelantinos
- c) dureros
- d) cu tegument hiperemiat
- e) nu lasa godeu

31. Intrebarea nr. 31: I526 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Exotoxina Bacillus antracis consta din 3 factori:

- a) edematos
- b) protector
- c) necrotic
- d) letal
- e) hemoragic

32. Intrebarea nr. 32: I527 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

In antrax veziculele (fice) secundare apar pe :

- a) crusta
- b) edemul tegumentar
- c) fâșia ingusta de culoare galbue-purulenta
- d) valul inflamator
- e) regiunea nodulilor limfatici învecinați

33. Intrebarea nr. 33: I528 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

O particularitate a crustei in antrax este :

- a) proemina de asupra dermei
- b) dureroasă
- c) este de culoare rosie

d) nedureroasă

e) se mentine 1-2 zile

34. Intrebarea nr. 34: I529 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Pentru antraxul cutanat este caracteristic:

a) Simptomul Stefanski

b) Simptomul Govorov-Godelie

c) Simptomul Padalco

d) Simptomul Filipovici

e) Simptomul Murson

35. Intrebarea nr. 35: I530 **Capitol:** antrax **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

In antrax pneumonia este:

a) hemoragică

b) crupoasă

c) bilateral lobara

d) bilateral necrotica

e) interstitiala

36. Intrebarea nr. 36: I20 **Capitol:** borelioza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatia corecta privitor la borelioza:

a) borelioza este o afectiune cu focar natural

b) boala este provocata de chlamidii

c) plosnita (triatomele) este transmitatorul boreliozei

d) borelioza este o infectie autolimitata, nu poate croniciza

e) metoda bacteriologica este frecvent utilizata in diagnosticarea de laborator a boreliozei

37. Intrebarea nr. 37: I21 **Capitol:** borelioza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce investigatie de laborator **nu** se face in diagnosticarea boreliozei?

a) ELISA

b) PCR (reactia de polimerizare in lant)

c) RIF (reactia de imunofluorescenta inderecta)

d) Western-blot

e) Bacterioscopia

38. Intrebarea nr. 38: I22 **Capitol:** borelioza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatia **falsa** privitoare la borelioza:

a) borelioza este o spirohetoza

b) rezervorul natural sunt rozatoarele, mamiferile, eventual pasarile

c) un rol epidemiologic esential il are calea de transmitere aerogena

d) focarele naturale de borelioza se asociaza frecvent cu cele de encefalita acariana

e) morbiditatea prin borelioza are caracter sezonier

39. Intrebarea nr. 39: I23 **Capitol:** borelioza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Indicati afirmatia **falsa** privitoare la borelioza:

- a) in plan patogenetic borelioza este apreciata ca un proces polisistemic
- b) receptivitatea este universala
- c) perioada de incubatie poate dura pana la 30 zile (in mediu 1-2 saptamani)
- d) artrita este caracteristica stadiului I de boala
- e) markerul clinic principal al boreliozei este eritemul migrator

40. Intrebarea nr. 40: I24 Capitol: borelioza Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Ce manifestari clinice pot fi evidentiata in stadiul I de borelioza?

- a) eritem migrator
- b) sindrom de intoxicatie generala
- c) artrita benigna recidivanta
- d) uneori hepatosplenomegalia si limfadenopatia
- e) artrita cronica progresiva

41. Intrebarea nr. 41: I25 Capitol: borelioza Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Enumerati manifestarile clinice, caracteristice eritemului migrator în borelioza:

- a) apare dupa 2-14 zile dupa muscatura capusii
- b) partea periferica a eritemului are o forma inelara
- c) eritemul anular apare in regiuni indepartate de locul muscaturii capusei
- d) eritemul are caracter stationar, nu se extinde
- e) eritemul nu prezinta o sensibilitate dureroasa exprimata

42. Intrebarea nr. 42: I26 Capitol: borelioza Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Indicati afirmatiile corecte referitor la stadiul III de borelioza :

- a) eritemul migrator anular este o manifestare clinica patognomica
- b) se instaleaza la cateva luni - 2 ani de la debut
- c) este dominat de manifestarile articulare
- d) procesul patologic are o evolutie cronica continua sau recidivanta
- e) frecvent se instaleaza insuficienta renala cronica

43. Intrebarea nr. 43: I27 Capitol: borelioza Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Indicati afirmatiile corecte referitor la stadiul II de borelioza :

- a) se instaleaza la 2-6 saptamana de boala
- b) 15% din bolnavi pot prezenta tulburari neurologice
- c) in 8-10% din cazuri apar semne de bloc atrio-ventricular
- d) apare poliartrita anchilozanta
- e) intotdeauna se instaleaza tratamentul cu glucocorticosteroizi

44. Intrebarea nr. 44: I28 Capitol: borelioza Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Indicati afirmatiile corecte in borelioza:

- a) in borelioza se instaleaza tratamentul cu antibiotice cu spectrul larg de actiune
- b) in stadiul clinic II - III borelioza se supune greu tratamentului
- c) eritemul migrator recidiveaza in stadiul III
- d) borelioza se cronicizeaza in majoritatea cazurilor

e) diagnosticul definitiv se confirmă în baza datelor serologice uneori și PCR

45. Întrebarea nr. 45: I29 **Capitol:** borelioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** n
Indicați afirmațiile corecte în borelioza:

- a) artrita cronică progresivă este caracteristică stadiului I de boală
- b) primele semne de borelioza dispar definitiv în decurs de câteva săptămâni chiar și în lipsa tratamentului
- c) în stadiul II pot apărea semne de meningoencefalită, radiculonevrită motorie sau senzorială, nevrită nervilor cranieni
- d) în borelioza cel mai frecvent este afectat genunchiul, urmat de cot, gleznă
- e) pneumonia bazală, bilaterală, cu evoluție trenantă, este caracteristică stadiului II de borelioza

46. Întrebarea nr. 46: I487 **Capitol:** borelioza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scăzut
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu
Borrelia Burgdorferi în primul stadiu al bolii poate disemina:

- a) prin fibrele motoare ale nervilor periferici
- b) prin sistemul circulator migrând spre periferia pielii
- c) către neuronii motori ai centrilor motori spinali și ai bulbului rahidian
- d) către nodulii limfatici mezenterici
- e) în endoteliul capilarelor

47. Întrebarea nr. 47: I488 **Capitol:** borelioza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scăzut
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu
Pentru stadiul I al Bolii Lyme este caracteristică manifestarea:

- a) eritem cu margini bine conturate cu aspect de hartă geografică
- b) eritem cu component hemoragic
- c) descuamare furfuracee
- d) eritem inelar cu centrul palid
- e) localizare pe fețe și membrele inferioare

48. Întrebarea nr. 48: I489 **Capitol:** borelioza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scăzut
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu
Care este mecanismul de transmitere a Boreliozei ?

- a) fecal-oral
- b) aerogen
- c) transmisibil
- d) parenteral
- e) transplacentar

49. Întrebarea nr. 49: I490 **Capitol:** borelioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu
Ce manifestări clinice se pot întâlni în perioada de diseminare timpurie a boreliozei?

- a) angină lacunară
- b) limfadenopatie regională sau generalizată
- c) angină eritematoasă
- d) conjunctivită
- e) diaree

50. Întrebarea nr. 50: I491 **Capitol:** borelioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu
Ce manifestări neurologice tardive pot apărea în caz de borelioză?

- a) degradare neuro-psihică
- b) meningoencefalită progresivă
- c) pseudoscleroză în plăci
- d) contractura permanentă a musculaturii coloanei vertebrale
- e) disfagie

51. Întrebarea nr. 51: I492 **Capitol:** borelioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

În caz de eritem migrator în Borelioză se dezvoltă:

- a) reacție inflamatorie cu hiperplazia celulelor reticulo-endoteliale
- b) infiltrație limfohistiocitară profundă
- c) infiltrație perivasculară superficială
- d) infiltrație interstițială
- e) ulcerăție carbunoasă

52. Întrebarea nr. 52: I493 **Capitol:** borelioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

În tabloul clinic al Bolii Lyme distingem:

- a) ptoză palpebrală unilaterală
- b) eritem migrator cronic
- c) meningită cu pleiocitoză limfocitară
- d) meningită cu pleiocitoză neutrofilică
- e) poliartrită sistemică

53. Întrebarea nr. 53: I494 **Capitol:** borelioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Ce manifestări neurologice pot fi în stadiul II al Bolii Lyme?

- a) paralizia de nerv facial
- b) radiculonevrite motorii
- c) meningită cu lichid clar
- d) neuralgii pe traiectul nervilor
- e) midriază

54. Întrebarea nr. 54: I495 **Capitol:** borelioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Ce manifestări cardiace se pot înregistra în Borelioză?

- a) bradicardie
- b) bloc atrio-ventricular
- c) miopericardită
- d) pancardită
- e) viciu cardiac

55. Întrebarea nr. 55: I496 **Capitol:** borelioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

În tratamentul Bolii Lyme se vor utiliza:

- a) Doxiciclină
- b) Metronidazol
- c) Amoxicilina
- d) Ceftriaxon
- e) Azitromicina

56. Întrebarea nr. 56: I30 **Capitol:** bruceleza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Indicati afirmatia corecta privitor la bruceloza

- a) brucelele sunt imobile, formeaza spori, sunt Gram negative
- b) brucelele cresc rapid si trec din formele S in formele R si L
- c) brucelele nu suporta bine temperatura joasa
- d) brucelele se caracterizeaza prin capacitate invaziva inalta si parazitare intracelulara
- e) sursa principala de infectie o constituie cainii, camilele, pisicile

57. Intrebarea nr. 57: I31 Capitol: bruceloza Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Indicati afirmatia corecta privitor la bruceloza:

- a) molipsirea omului se produce exclusiv pe cale alimentara
- b) pentru bruceloza nu-i tipic caracterul sezonier de imbolnavire
- c) imunitatea in bruceloza nu este stabila si de lunga durata
- d) bruceloza foarte usor se trateaza cu antibiotice
- e) bruceloza poate fi transmisa de la om la om

58. Intrebarea nr. 58: I32 Capitol: bruceloza Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Indicati afirmatia **incorecta** referitor la diagnosticul de laborator al brucelozei:

- a) metoda bacteriologica se aplica in functie de stadiul bolii si forma clinica
- b) cresterea culturii de brucele este utilizata pe larg in practica medicala
- c) rezultatele pozitive in reactia Huddelson trebuie verificate prin reactia Wright
- d) in forma cronica de bruceloza aglutinarea poate lipsi in reactia Wright din cauza anticorpilor blocanti monovalenti
- e) RHAI si ELISA sunt reactii specifice si sensibile in diagnosticarea brucelozei

59. Intrebarea nr. 59: I33 Capitol: bruceloza Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Care sindrom clinic nu-i caracteristic pentru bruceloza acuta:

- a) pirosudoroalgic
- b) hepatosplenomegalic
- c) microlimfadenopatic
- d) astenovegetativ
- e) de coagulare intravasculara disemenata

60. Intrebarea nr. 60: I34 Capitol: bruceloza Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte referitor la bruceloza acuta:

- a) in timpul accesului febril bolnavii sunt inapti de munca, pot fi in prostratie, obnubilare
- b) pentru bruceloza acuta este tipica hiperhidroza manifesta
- c) ganglionii limfatici sunt duri, hiperemiati, durerosi la palpare, de 2-3 cm
- d) pacientii pot avea bradicardie relativa in perioada febrila si tahicardie in defervescenta
- e) organele respiratorii sunt lezate rar

61. Intrebarea nr. 61: I35 Capitol: bruceloza Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Ce manifestari clinice sunt caracteristice brucelozei acute:

- a) simptomul microlimfopoliadenic
- b) dereglarile functiei sistemului nervos vegetativ
- c) leziuni locale organice ale aparatului locomotor
- d) lezarea rara a organelor respiratorii
- e) majorarea ALAT de 20 ori

62. Intrebarea nr. 62: I36 Capitol: bruceloza Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10

Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Ce manifestari clinice sunt caracteristice brucelozei subacute:

- a) sinovite, bursite
- b) celulite, fibrozite
- c) poliartrita
- d) spondilita
- e) accese febrile multiple

63. Intrebarea nr. 63: I37 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati manifestarile clinice care pot fi frecvent intalnite in bruceloza cronica:

- a) poliartrita tibio-tarsiana
- b) spondilita lombosacrala
- c) radiculite
- d) sindrom asteno-vegetativ
- e) spondilita cervicala

64. Intrebarea nr. 64: I38 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati evolutia posibila a brucelozei:

- a) acuta
- b) trenanta
- c) subicterica
- d) reziduala
- e) inaparent progresiva

65. Intrebarea nr. 65: I39 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati ce modificari in datele de laborator pot fi intalnite in bruceloza:

- a) limfomonocitoza moderata
- b) leucopenie moderata
- c) leucocitoza pronuntata
- d) proteinurie, cilindrurie, hematurie
- e) majorarea considerabila a creatininei si ureei

66. Intrebarea nr. 66: I40 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati ce brucele frecvent cauzeaza imbolnavire la oameni:

- a) B.neotomae
- b) B.melitensis
- c) B.ovis
- d) B.abortus bovis
- e) B.suis

67. Intrebarea nr. 67: I41 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatiile corecte referitor la bruceloza:

- a) bruceloza este o afectiune infectios-alergica
- b) in bruceloza acuta antibioticele se prescriu conform unei scheme intermitent ciclice
- c) in bruceloza cronica tratamentul antibacterian se aplica in recidive cu semne de generalizare
- d) in bruceloza cronica se indica tratamentul cu corticosteroizi pe termen lung
- e) in bruceloza reziduala se indica tratamentul cu tetraciclina, rimfapicina sau/si levomicitina

68. Intrebarea nr. 68: I503 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Selectați afirmația corectă referitor la Bruceloză:

- a) este o maladie cu morbiditate înaltă
- b) nu are caracter sezonier
- c) infecția are caracter profesional
- d) este maladie dirijabilă (cu vaccinare obligatorie)
- e) se transmite aerogen

69. Intrebarea nr. 69: I504 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Pentru Bruceloză este caracteristic:

- a) frisoanele
- b) hiperhidroza
- c) dureri abdominale
- d) dureri în maxilare
- e) cefalee intensă

70. Intrebarea nr. 70: I505 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Pentru Bruceloză acută primară nu este caracteristică:

- a) debut brusc
- b) febră 39°
- c) frison
- d) transpirații abundente nocturne
- e) diareea

71. Intrebarea nr. 71: I506 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

În Bruceloză acută putem depista:

- a) limfadenopatie
- b) vomă
- c) diaree
- d) candidoză orală
- e) hemoragii nazale

72. Intrebarea nr. 72: I507 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Pentru bruceloză este caracteristică:

- a) insuficiență renală
- b) dureri în mușchii gastrocnemieni
- c) erupții hemoragice cu necroză în centru
- d) transpirații nocturne
- e) abces hepatic

73. Intrebarea nr. 73: I508 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Alegeți afirmațiile corecte referitor la Bruceloză:

- a) sursa de infecție pentru om sunt rozătoarele
- b) sursa de infecție pentru om este reprezentată de animalele domestice
- c) agentul patogen se elimină prin materiale de avort, urină, lapte
- d) transmiterea germenilor se face preponderent pe cale aeriană
- e) transmiterea agentului are loc pe cale alimentară și de contact

74. Intrebarea nr. 74: I509 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Referitor la speciile de Brucella următoarele afirmații sunt adevărate:

- a) se multiplică intracelular
- b) peretele celular are similarități cu endotoxina bacililor gram negativi
- c) nu rezistă mult timp în mediul exterior
- d) se cultivă ușor pe medii uzuale
- e) pot fi utilizați ca armă biologică

75. Intrebarea nr. 75: I510 **Capitol:** bruceleza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Transmiterea Brucelei la om se produce pe cale:

- a) de contact
- b) alimentară
- c) percutan
- d) transplacentar
- e) aerogen

76. Intrebarea nr. 76: I511 **Capitol:** bruceleza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

În perioada febrilă în Bruceleză pot fi:

- a) tahicardie
- b) bradicardie
- c) cefalee intensă
- d) hiperemia feței
- e) transpirații abundente

77. Intrebarea nr. 77: I512 **Capitol:** bruceleza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Pentru bruceleza acută sunt caracteristice:

- a) subfebrilitatea
- b) mialgii
- c) artralгии
- d) orhita
- e) anchiloze

78. Intrebarea nr. 78: I513 **Capitol:** bruceleza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Pentru bruceleza trenantă sunt caracteristice:

- a) subfebrilitatea sau temperatura normală
- b) bursita
- c) afectarea articulațiilor mici
- d) afectarea articulațiilor mari
- e) se afectează o singură articulație

79. Intrebarea nr. 79: I514 **Capitol:** bruceleza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

În Bruceleza trenantă pot apărea:

- a) nevrite
- b) paralizii

- c) cecitate
- d) dezvoltarea sterilității
- e) hemoragii gastrointestinale

80. Intrebarea nr. 80: I515 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

În Bruceloza cronică se dezvoltă:

- a) poliartrita cu deformații ireversibile
- b) spondiloze ale coloanei vertebrale
- c) hepatomegalie
- d) edem cerebral
- e) hipertermie

81. Intrebarea nr. 81: I516 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Pentru Bruceloză sunt caracteristice:

- a) lezarea cordului de tipul pancarditei
- b) poliradiculite
- c) hepatosplenomegalie
- d) mialgii și artralгии
- e) icter

82. Intrebarea nr. 82: I517 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

În hemogramă în Bruceloză se pot înregistra:

- a) leucopenia
- b) limfocitoza
- c) monocitoza
- d) leucocitoza cu deviere spre stînga
- e) hipereozinofilie

83. Intrebarea nr. 83: I518 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Diagnosticul de laborator al brucelozei se bazează pe:

- a) Reacția de aglutinare lentă Wright
- b) Reacția de aglutinare pe lamă Huddelson
- c) Intradermoreacția Burnet
- d) Reacția Paul-Bunnell
- e) Reacția Vidal

84. Intrebarea nr. 84: I519 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Pentru bruceloză sunt caracteristice următoarele mecanisme patogenetice:

- a) diseminare prin fibrele motoare ale nervilor periferici
- b) reacții inflamatorii de tip granulomatos
- c) fenomene de sensibilizare de tip întârziat
- d) fenomene toxice datorită endotoxinei bruceloase
- e) diseminare către nodulii limfatici mezenterici

85. Intrebarea nr. 85: I520 **Capitol:** bruceloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

În tratamentul brucelozei se vor utiliza:

- a) Tetraciclina
- b) Rifampicina
- c) Penicilina
- d) Gentamicina
- e) Ceftriaxon

86. Intrebarea nr. 86: I42 **Capitol:** botulism **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In diagnosticul botulismului importanta practica cea mai mare o are metoda :

- a) bacteriologica
- b) biochimica
- c) alergologica
- d) biologica
- e) bacterioscopica

87. Intrebarea nr. 87: I43 **Capitol:** botulism **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In R.Moldova botulismul mai frecvent este provocat de serovariantul :

- a) G
- b) A
- c) E
- d) B
- e) C

88. Intrebarea nr. 88: I44 **Capitol:** botulism **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In tratamentul botulismului se va utiliza urmatoarea combinatie de seruri monovalente :

- a) B+C+D
- b) B+A+G
- c) A+B+E
- d) B+D+A
- e) G+A+C

89. Intrebarea nr. 89: I45 **Capitol:** botulism **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care este cauza sindromului paralic in botulism ?

- a) actiunea directa a botulotoxinei asupra arteriolelor
- b) actiunea directa a botulotoxinei asupra capilarelor
- c) actiunea directa a botulotoxinei asupra muschilor
- d) actiunea directa a botulotoxinei asupra terminatiunilor nervoase
- e) blocarea de catre botulotoxina a acetilcolinei din sinapse

90. Intrebarea nr. 90: I46 **Capitol:** botulism **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Botulotoxina la temperatura de fierbere se inactiveaza timp de :

- a) momentan
- b) 1-2 min
- c) 10-25 min
- d) mai mult de 2 ore
- e) nu se inactiveaza la fierbere

91. Intrebarea nr. 91: I47 **Capitol:** botulism **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care-i actiunea botulotoxinei asupra organismului uman?

- a) Deregleaza transmiterea excitatiei de la nerv la muschi
- b) Inhiba neuronii intercalari din arcurile reflexe polisinaptice
- c) Actiunea citolitica asupra hepatocitelor
- d) Provoaca dezvoltarea nefrozo-nefritei
- e) Are actiune autoimuna

92. Intrebarea nr. 92: I48 **Capitol:** botulism **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In favoarea diagnosticului de botulism pledeaza :

- a) xerostomia
- b) anizocoria
- c) mioza
- d) sindromul gastroenteric la debutul bolii
- e) hipertonusul muscular

93. Intrebarea nr. 93: I49 **Capitol:** botulism **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru botulism sunt caracteristice sindroamele :

- a) meningian
- b) oftalmoplegic
- c) miastenic
- d) gastrointestinal
- e) colestatic

94. Intrebarea nr. 94: I50 **Capitol:** botulism **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In ce consta simptomatologia neurologica in botulism caracteristica sindromului oftalmoplegic

- a) anisocorie
- b) ptoza unilaterala
- c) nistagmus
- d) strabism
- e) mioza

95. Intrebarea nr. 95: I51 **Capitol:** botulism **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In tratamentul botulismului se efectueaza :

- a) spalaturi gastrice
- b) terapia de deshidratare
- c) seroterapia cu desensibilizarea fractionata
- d) administrarea de antivirale
- e) terapia de dezintoxicare

96. Intrebarea nr. 96: I52 **Capitol:** botulism **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru botulism sunt caracteristice semnele clinice :

- a) diplopia
- b) paralizie unilaterala
- c) midriaza
- d) febra 38-39⁰C
- e) pareza valului palatin

97. Intrebarea nr. 97: I53 **Capitol:** botulism **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In botulism sunt caracteristice urmatoarele sindroame :

- a) mioneuroplegic
- b) gastrointestinal
- c) meningeal
- d) oftalmoplegic
- e) hipovolemic

98. Intrebarea nr. 98: I54 **Capitol:** botulism **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Alegeti simptomele caracteristice pentru botulism :

- a) disfagia
- b) dereglarea constiintei
- c) anizocorie
- d) diplopie
- e) ptoza palpebrala unilaterala

99. Intrebarea nr. 99: I55 **Capitol:** botulism **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Cu ce maladii se face diagnosticul diferential in botulism :

- a) tetanos
- b) toxiinfectii alimentare
- c) febra tifoida
- d) otravire cu ciuperci
- e) encefalita

100. Intrebarea nr. 100: I56 **Capitol:** dizenteria **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati semnul caracteristic pentru varianta colitica de dizenterie acuta:

- a) dureri in regiunea ileocecala dreapta
- b) scaun riziform
- c) chemari false
- d) urina hiperocroma
- e) scaun abundent, de culoare verde

101. Intrebarea nr. 101: I57 **Capitol:** dizenteria **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In forma colitica a dizenteriei durerile sunt localizate preponderent in regiunea:

- a) epigastrica
- b) mezogastrica
- c) ombilicala
- d) iliaca dreapta
- e) iliaca stanga

102. Intrebarea nr. 102: I58 **Capitol:** dizenteria **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Semnul caracteristic pentru forma colitica de dizenterie este:

- a) voma repetata
- b) hepatomegalia
- c) scaun lichid, cu mucus si striuri de sange
- d) dureri in portiunile superioare ale abdomenului
- e) imfadenopatia

103. Intrebarea nr. 103: I59 **Capitol:** dizenteria **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In forma clasica de dizenterie este preponderent afectat:

- a) ileonul
- b) ntestinul subtire
- c) colonul transversus
- d) rectul si sigmoidul
- e) duodenul

104. Intrebarea nr. 104: I60 **Capitol:** dizenteria **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
 Sindromul colitic in dizenterie se caracterizeaza prin:

- a) enesme
- b) chemari false
- c) scaun saracacios, cu mucus si striuri de sange
- d) scaun lichid, abundent, verzui
- e) dureri in regiunea iliaca dreapta

105. Intrebarea nr. 105: I61 **Capitol:** dizenteria **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
 Complicatiile posibile in dizenterie forma colitica sunt:

- a) socul toxiinfectios
- b) socul hipovolemic
- c) socul anafilactic
- d) prolapsul rectal
- e) fisura sfincterului anal

106. Intrebarea nr. 106: I62 **Capitol:** dizenteria **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
 In tratamentul dizenteriei acute se administreaza:

- a) preparate nitrofuranice
- b) benzilpenicilina
- c) sulfadimezina
- d) tinidazolul (fazijina)
- e) biseptol

107. Intrebarea nr. 107: I63 **Capitol:** dizenteria **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
 Enumerati afirmatiile corecte referitoare la dizenterie

- a) in functie de evolutia clinica dizenteria bacteriana se divide in acuta si cronica
- b) rezervorul principal al infectiei este, in cea mai mare parte, extrauman
- c) mai grav evoluiaza dizenteria provocata de bacilii Grigoriev-Shiga
- d) in peste 90% din cazuri portajul subclinic de bacili este de scurta durata
- e) se poate complica prin hemoragii masive si insuficienta hepato-renala

108. Intrebarea nr. 108: I64 **Capitol:** dizenteria **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
 In dizenterie este necesar de efectuat diagnosticul diferential cu:

- a) colita ulceroasa nespecifica
- b) salmoneloza
- c) borelioza
- d) mononucleoza infectioasa
- e) balantidiaza

109. Intrebarea nr. 109: I65 **Capitol:** dizenteria **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce investigatii paraclinice sunt recomandate in forma clasica de dizenterie:

- a) examinarea bacteriologica a materiilor fecale
- b) examinarea bacteriologica a sangelui
- c) examenul coprologic
- d) colonoscopia
- e) investigatii serologice

110. Intrebarea nr. 110: I66 **Capitol:** dizenteria **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In ce situatii este recomandata rectomanoscopia sau colonoscopia

- a) in formele atipice de dizenterie
- b) la toti convalescentii de dizenterie
- c) in febra paratifoida B
- d) in formele cronice de dizenterie
- e) in cazurile suspecte de purtatori de bacili dizenterici

111. Intrebarea nr. 111: I67 **Capitol:** erizipel **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Erizipelul recidivant este provocat de :

- a) stafilococcus aureus
- b) asocieri stafilococ+streptococ
- c) L forme de streptococ B-hemolitic
- d) streptococ A-hemolitic
- e) streptococi din grupul C

112. Intrebarea nr. 112: I68 **Capitol:** erizipel **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Formele clinice ale erizipelului sunt :

- a) eritematoasa
- b) ulcero-bubonica
- c) oculo-bubonica
- d) eritematoasa-buloasa
- e) buloasa-hemoragica

113. Intrebarea nr. 113: I69 **Capitol:** erizipel **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Semnele caracteristice ale erizipelului sunt:

- a) debut cu febra, insotita adesea de frisoane si stare generala alterata
- b) local apare un placard fierbinte, edematos, eritematos, bine delimitat cu adenopatie locoregionala sensibila
- c) se poate localiza oriunde pe corp, dar in ordinea frecventei, se intilneste la nivelul membrelor inferioare, superioare, fetei, pavilionului urechii
- d) este obligator triada clinica locala prin carbune, vezici fiice si edem pronuntat
- e) este caracteristica instalarea sindromului de deshidratare pronuntata

114. Intrebarea nr. 114: I70 **Capitol:** erizipel **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10

Timp pe intrebare: 0 sec **Autor:** n

In evolutia erizipelului pot surveni:

- a) complicatii locale: necroze, gangrene, abcese, flegmoane, flebite
- b) complicatii generale: septicemie, reumatism articular acut
- c) in urma suportarii erizipelului se dezvoltata imunitate stabila

d) nu sunt caracteristice recidivele și suportările repetate în această infecție

e) dereglările de microcirculație poate cauza elefantiazis

115. Întrebarea nr. 115: I71 **Capitol:** erizipel **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** n

Tratamentul în erizipel constă în următoarele măsuri:

a) repaus la pat

b) tratament etiologic: cu Penicilina G sau Eritromicina sau Azitromicina sau Claritromicina, Amoxiciclina + Acid Clavulamic sau Cefalosporine

c) tratamentul patogenetic: antiinflamatoare nesteroidiene, antiagregante, trofice vasculare

d) corticoterapie în cazurile usoare

e) aplicarea pansamentului local

116. Întrebarea nr. 116: I497 **Capitol:** erizipel **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scăzut
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Erizipelul este cauzat de :

a) Stafilococ

b) Streptococcus B-hemolitic din grupul A

c) Meningococ

d) Pneumococ

e) Gonococ

117. Întrebarea nr. 117: I498 **Capitol:** erizipel **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scăzut
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Agentul patogen al erizipelului pătrunde în organism:

a) Prin leziuni de continuitate tegumentară

b) Prin înțepături de căpușă

c) Prin înțepături de țânțar

d) La nivelul tubului digestiv

e) Prin inoculare directă hematogenă

118. Întrebarea nr. 118: I499 **Capitol:** erizipel **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Pentru erizipel sunt caracteristice:

a) placard bine delimitat cu burelet marginal

b) placard cald, edematos, eritematos

c) adenopatie loco-regională

d) ulcerăție carbunoasă

e) eritem inelar cu paliditate în centru

119. Întrebarea nr. 119: I500 **Capitol:** erizipel **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

Erizipelul debutează cu următoarele semne clinice:

a) febră 38-39°

b) limfadenopatie regională

c) modificări cutanate

d) artralgii

e) dureri abdominale

120. Întrebarea nr. 120: I501 **Capitol:** erizipel **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

În tratamentul etiotrop al erizipelului se utilizează :

- a) Fluorchinolone
- b) Sulfanilamide
- c) Penicilină
- d) Cefotaxim
- e) Eritromicina

121. Intrebarea nr. 121: I502 **Capitol:** erizipel **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** i.rusu

După suportarea erizipelului :

- a) se dezvoltă imunitate durabilă
- b) apare predispoziție la recidive
- c) se poate dezvolta limfostaza
- d) rămân cicatrice în locul afecțiunii cutanate
- e) poate rămâne hiperpigmentarea tegumentelor

122. Intrebarea nr. 122: I72 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In favoarea febrei tifoide pledeaza :

- a) febra cu durata de 10 saptamani
- b) hiperemia fetei
- c) bradicardia relativa
- d) tahicardia
- e) dureri pronuntate in abdomen

123. Intrebarea nr. 123: I73 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru febra tifoida este caracteristic :

- a) hepatomegalie
- b) hiperemia fetei
- c) dureri lombare
- d) eruptii petesiale
- e) s.Rozenberg pozitiv

124. Intrebarea nr. 124: I74 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati agentul patogen al febrei tifoide

- a) Salmonella
- b) Shigella
- c) Entamoeba histolytica
- d) Streptococcus
- e) Klebsiella

125. Intrebarea nr. 125: I75 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In primele 2-3 zile de boala in febra tifoida este caracteristic urmatoarea modificare in hemoleucograma:

- a) leucocitoza moderata
- b) leucopenie
- c) aparitia de mononucleare atipice
- d) limfopenie
- e) eozinofilie

126. Intrebarea nr. 126: I76 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Semnul clinic tipic in febra tifoida este:

- a) semnul Govorov

- b) Morozkin
- c) Padalko
- d) Rosenberg
- e) Chiari-Avtin

127. Intrebarea nr. 127: I77 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru febra tifoida sunt caracteristice semnele clinice :

- a) abdomen balonat
- b) tahicardie
- c) constipatii
- d) ficat normal
- e) eruptii sub forma de rozeole

128. Intrebarea nr. 128: I78 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

La externarea convalescentilor dupa febra tifoida se vor efectua urmatoarele investigatii :

- a) hemocultura
- b) coprocultura
- c) rozeolocultura
- d) urinocultura
- e) bilicultura

129. Intrebarea nr. 129: I79 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In favoarea diagnosticului de febra tifoida pledeaza semnele clinice :

- a) febra 38-39
- b) bradicardia relativa
- c) rozeole cutanate
- d) mialgii in muschii gastrocnemieni
- e) oligo-anuria

130. Intrebarea nr. 130: I80 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru febra tifoida sunt caracteristice complicatiile :

- a) socul anafilactic
- b) socul toxiinfectios
- c) hemoragii digestive
- d) perforatia intestinului gros
- e) perforatia intestinului subtire

131. Intrebarea nr. 131: I563 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Exantemul in febra tifoida are caracter de:

- a) rozeole-petesii
- b) vezicule
- c) petesii
- d) rozeole
- e) cruste

132. Intrebarea nr. 132: I564 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

In primele 3 zile de boala febra tifoida poate fi confirmata prin:

- a) hemocultura
- b) urocultura

- c) bilicultura
- d) coprocultura
- e) insamintarea maselor vomitive

133. Intrebarea nr. 133: I565 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Perioada de incubatie in febra tifoida:

- a) 1-7 zile
- b) 7-21 zile
- c) 24- 30 zile
- d) 30-40 zile
- e) 40-60 zile

134. Intrebarea nr. 134: I566 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

In favoarea febrei tifoide pledeaza:

- a) febra ridicata timp de 3-4 saptamani
- b) scaun fertura de orez
- c) meteorism
- d) hepatomegalie
- e) abdomen retractat

135. Intrebarea nr. 135: I567 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Examinarile de laborator efectuate in febra tifoida in perioada de convalescenta la externare:

- a) coprocultura
- b) urinocultura
- c) hemocultura
- d) rozeolocultura
- e) bilicultura

136. Intrebarea nr. 136: I568 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Externarea convalescentilor dupa febra tifoida se va efectua:

- a) dupa 21 de zile de temperatura normala daca a fost tratat cu antibiotice
- b) dupa 14 zile de temperatura normala daca nu a fost tratat cu antibiotice
- c) după rezultatul negativ al hemoculturii
- d) dupa 10 zile de t- normala
- e) după rezultatul negativ al biliculturii

137. Intrebarea nr. 137: I569 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

In perioada initiala al febrei tifoide febra are caracter

- a) gradat „scalariform”
- b) atinge valori maxime la a 5 - 7 zi
- c) din prima zi t 39,5 - 40⁰ C
- d) ondulantă
- e) din prima zi t 37,5 - 38⁰

138. Intrebarea nr. 138: I570 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

In febra tifoida exantemul se caracterizeaza prin:

- a) apare la 8-9 zi de boala
- b) apare la 4-5 zi de boala
- c) rozeolice

- d) veziculoase
- e) monomorfe

139. Intrebarea nr. 139: I571 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

La bolnavii cu febra tifoida limba este:

- a) edematiata cu amprente dentare
- b) limba „zmeurie,,
- c) limba „lacuita,,
- d) cu depuneri sur-cafenii, uscata
- e) limba „prajita"

140. Intrebarea nr. 140: I572 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

In perioada de stare a febrei tifoide se constituie curbe termice:

- a) Intermitenta
- b) ondulanta
- c) continua
- d) tip Keldișevschi
- e) subfebrila

141. Intrebarea nr. 141: I573 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Starea tifica in febra tifoida se manifesta prin:

- a) obnubilare
- b) delir
- c) halucinații
- d) agitare
- e) hiperexcitabilitate

142. Intrebarea nr. 142: I574 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

In perioada de stare a febrei tifoide modificarile in hemograma sunt:

- a) leucocitoza
- b) leucopenia
- c) monocitoza
- d) limfocitoza
- e) aneozinofilia

143. Intrebarea nr. 143: I575 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Alegeti simptomele caracteristice pentru febra tifoida:

- a) insomnie
- b) indiferenta
- c) inapetenta
- d) agitare
- e) astenie

144. Intrebarea nr. 144: I576 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

In tratamentul Febrei tifoide nu se utilizeaza:

- a) antibioticoterapia
- b) detoxicarea
- c) seroterapia
- d) vaccinoaterapia
- e) γ - globulina

145. Intrebarea nr. 145: I577 **Capitol:** febra tifoida **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Examinarea abdomenului la bolnavii de febra tifoida prezinta:

- a) meteorism
- b) simptomul Padalko pozitiv
- c) crepitație palpatorie
- d) Filipovici
- e) Dureri sub rebordul stang

146. Intrebarea nr. 146: l81 **Capitol:** generale **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care maladie face parte din grupul infectiilor de contact (prin tegumentele lezate) ?

- a) HVE
- b) febra tifoida
- c) rabia
- d) febra Q
- e) boala Brill

147. Intrebarea nr. 147: l82 **Capitol:** generale **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Curba termica continua se caracterizeaza prin:

- a) temperatura in jurul la 39°C, cu oscilatii de 1°C, de o durata de la cateva zile pana la cateva saptamani si chiar luni;
- b) oscilatii de 3-5°C in 24 ore, cu cadere brusca la indici normal sau subnormal;
- c) oscilatii nesistemizate in timp si cu aparitie nereglata de la o zi la alta;
- d) aparitia acceselor febrile cu regularitate in intervale stricte de 2-3 zile;
- e) oscilatii de 2-3°C in 24 ore, temperatura de dimineata fiind putin mai ridicata sau normala.

148. Intrebarea nr. 148: l83 **Capitol:** generale **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Antibioticoterapia se indica coerspuzator urmatorilor criterii:

- a) respectarea dozelor si ritmul de administrare, care asigura concentratii eficiente si constante;
- b) adaptarea la severitatea infectiei si natura focarului;
- c) in cazuri grave pentru initierea tratamentului este obligatorie determinarea sensibilitatii germenului;
- d) evitarea efectelor toxice si supradozarii;
- e) administrarea intramusculara e utilizabila pentru toate antibioticele;

149. Intrebarea nr. 149: l84 **Capitol:** generale **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Eficacitatea antibioticoterapiei se bazează in special pe :

- a) ameliorarea clinica rapida;
- b) aparitia unei localizari septice (embolii septice) ale infectiei;
- c) negativarea rezultatelor prelevarilor bacteriologice;
- d) persistenta semnelor locale si generale ale infectiei peste 48-72 ore de tratament;
- e) normalizarea devierilor biologice, hematologice (in special leucocitoza) si a indicilor de inflamatie;

150. Intrebarea nr. 150: l85 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In tratamentul etiotrop al gripei se administreaza :

- a) inhibitorii de reverstranscriptaza
- b) antibiotice
- c) oseltamevir
- d) ribavirina

e) vaccinul antigripal

151. Intrebarea nr. 151: I86 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru gripa este caracteristica inflamatia cailor respiratorii de tip :

- a) cataral
- b) fibrinos
- c) ibrino-necrotic
- d) fibrino-hemoragic
- e) purulent

152. Intrebarea nr. 152: I87 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Manifestarea clinica din gripa aviara:

- a) insuficienta hepatica acuta
- b) pneumonie rapid progresiva
- c) rinita muco-purulenta
- d) pancreatita acuta
- e) poliartrita

153. Intrebarea nr. 153: I88 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Cea mai frecventa complicatie in gripa este :

- a) glomerulonefrita
- b) pneumonia
- c) meningita
- d) pancreatita
- e) septicemia

154. Intrebarea nr. 154: I89 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru care infectie respiratorie virala acuta este caracteristica afectarea predominanta a traheei ?

- a) gripa
- b) paragripa
- c) adenoviroza
- d) infectie respiratorie sincitiala
- e) rinoviroza

155. Intrebarea nr. 155: I90 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce tip al virusului gripal provoaca pandemii ?

- a) A
- b) B
- c) C
- d) D
- e) E

156. Intrebarea nr. 156: I91 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru care infectie respiratorie virala acuta este caracteristica dezvoltarea crupului fals ?

- a) gripa
- b) paragripa
- c) adenoviroza

d) rinoviroza

e) infectie respiratorie sincitiala

157. Intrebarea nr. 157: I92 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Virusul gripal tip A contine :

a) ADN

b) ARN

c) neuraminidaza

d) reverstranscriptaza

e) hemaglutinina

158. Intrebarea nr. 158: I93 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati trasaturile caracteristice pentru gripa aviara:

a) detresa respiratorie acuta

b) sindrom febril cu semne de impregnare infectioasa

c) pneumonie rapid evolutiva

d) afectarea predominanta a cailor respiratorii superioare

e) dezvoltarea de meningita purulenta

159. Intrebarea nr. 159: I94 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Simptomele gripei sunt :

a) conjunctivita fibrinoasa

b) granulozitatea palatinului moale

c) simptomul Govorov pozitiv

d) febra pana la 39-40 C din prima zi

e) sclerita

160. Intrebarea nr. 160: I95 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Simptomele caracteristice pentru gripa sunt :

a) semnul Podalka pozitiv

b) cefalee frontala

c) eliminari seroase nazale din a 2-3 zi

d) rinoree abundenta seroasa din 1 zi

e) semnul Morozkin pozitiv

161. Intrebarea nr. 161: I96 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Simptomele caracteristice pentru paragripa sunt :

a) dureri abdominale

b) tusea latratoare

c) rinoree abundenta

d) febra

e) voce ragusita

162. Intrebarea nr. 162: I97 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Simptomele caracteristice pentru rinoviroze sunt :

a) bronhopneumonia

b) rinoreia pronuntata

- c) cefalea violenta
- d) subfebrilitatea
- e) semne minime de intoxicatie generala

163. Intrebarea nr. 163: I389 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Paragripa este provocata de :

- a) ARN virus
- b) AND virus
- c) g.Ortomyxovirus
- d) g.Mastadenovirus
- e) bacterii

164. Intrebarea nr. 164: I390 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Unul din semnele clinice caracteristice pentru paragripa?

- a) dureri abdominale
- b) tuse latratoare
- c) tuse uscata
- d) dureri retrosternale
- e) amigdalita

165. Intrebarea nr. 165: I391 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

In paragripa cel mai frecvent se afecteaza:

- a) laringele
- b) traheea
- c) bronhii
- d) faringele
- e) plaminii

166. Intrebarea nr. 166: I393 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Sindrom caracteristic in paragripa:

- a) sdr. toxic moderat
- b) sdr. hemoragic
- c) sdr.abdominal
- d) sdr.amigdalian
- e) lipsa sdr. de intoxicatie

167. Intrebarea nr. 167: I395 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Metoda de confirmare a diagnosticului de paragripa este:

- a) urocultura
- b) parazitologica
- c) coprologica
- d) R-tia Wasserman
- e) Imunoflorescenta directa

168. Intrebarea nr. 168: I396 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Semne caracteristice pentru paragripa sunt:

- a) tuse latratoare
- b) rinoree abundenta
- c) febra mai mult de 38°C
- d) dureri abdominale
- e) parotidita

169. Intrebarea nr. 169: I397 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

In paragripa date caracteristice in hemoleucograma vor fi:

- a) leucopenie
- b) limfocitoza
- c) monocitoza
- d) neutrofilie
- e) leucocitoza

170. Intrebarea nr. 170: I398 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Diagnosticul specific de paragripa se confirma prin metodele:

- a) Serologica
- b) bacteriologica
- c) parazitologica
- d) PCR
- e) Imunofluorescenta directa

171. Intrebarea nr. 171: I399 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

In tratamentul paragripei se utilizeaza:

- a) perimitamina
- b) lamivudina
- c) dexametazon
- d) bronhodilatatoare
- e) suprastin

172. Intrebarea nr. 172: I400 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Sindroame clinice caracteristice paragripei:

- a) intoxicatie generala moderata
- b) cataral din prima zi
- c) crup fals
- d) nefrotic
- e) hepatosplenomegalie

173. Intrebarea nr. 173: I401 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Simptomele caracteristice pentru paragripa sunt:

- a) hepatosplenomegalie
- b) tusea latratoare
- c) dureri la deglutitie
- d) febra mai mult de 38°C
- e) voce ragusita

174. Intrebarea nr. 174: I402 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
La IRVA se refera:

- a) legioneloza
- b) ornitoza
- c) gripa
- d) rujeola
- e) difteria

175. Intrebarea nr. 175: I403 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
In tratamentul formelor toxice de gripa se administreaza:

- a) pirimetamina
- b) metronidazol
- c) lamivudina
- d) oseltamivir
- e) aciclovir

176. Intrebarea nr. 176: I404 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Complicatia gripei este:

- a) septicemie
- b) peritonita
- c) pneumonia
- d) glomerulonefrita
- e) colecistita

177. Intrebarea nr. 177: I405 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Diagnosticul specific de gripa se confirma prin:

- a) bacteriologica
- b) PCR
- c) coprologica
- d) urocultura

e) parazitologica

178. Intrebarea nr. 178: I406 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Care modificare in leucograma este caracteristica pentru gripa?

a) leucopenie

b) hiperleucocitoza

c) neutrofiloza

d) aneozinofilie

e) limfopenie

179. Intrebarea nr. 179: I407 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Sindromul clinic predominant in gripa este?

a) sdr. hepatomegalie

b) sdr. toxic

c) sdr. eruptiv

d) sdr. nefrotic

e) sdr.anemic

180. Intrebarea nr. 180: I408 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Partea tractului respirator predominant afectata in gripa este:

a) Amigdalele

b) Alveolele

c) Bronsiiolele

d) Faringele

e) Bronsiile

181. Intrebarea nr. 181: I409 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Virusul gripal face parte din genul?

a) Paramyxovirus

b) Rhinovirus

c) Ortomyxovirus

d) Herpes virus

e) Metamyxovirus

182. Intrebarea nr. 182: I410 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Calea de transmitere a virusului gripal:

- a) Fecal-oral
- b) Hidrica
- c) Prin vectori
- d) Hematogen
- e) Aerogen

183. Intrebarea nr. 183: I411 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Complicatiile in gripa sunt:

- a) glomerulonefrita
- b) pneumonie
- c) otita
- d) meningita
- e) colecistita

184. Intrebarea nr. 184: I412 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
La IRVA se refera:

- a) mononucleoza infectioasa
- b) gripa
- c) paragripa
- d) borelioza
- e) rinoviroza

185. Intrebarea nr. 185: I413 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Tratamentul antiviral in gripa include:

- a) rimantadina
- b) oseltamivir
- c) amantadina
- d) aciclovir
- e) antibiotice

186. Intrebarea nr. 186: I414 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Care sunt semnele clinice in gripa hipertoxica:

- a) febra mai mare de 40°C
- b) rinoree abundenta in 1 zi
- c) subfebrilitate
- d) meningism
- e) sdr. hemoragic

187. Intrebarea nr. 187: I415 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Care nu sunt proteinele de suprafata cu putere antigenica in structura virusurilor gripalea:

- a) Hemaglutinina

- b) Neuroaminidaza
- c) Peptidaza
- d) Lipaza
- e) amilaza

188. Intrebarea nr. 188: I416 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Modificarile hemoleucogramei caracteristice in gripa sunt:

- a) leucocitoza
- b) aneozinofilie
- c) leucopenie
- d) limfocitoza
- e) monocitoza

189. Intrebarea nr. 189: I417 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Agentul cauzal al infectiilor rinovirale face parte din genul:

- a) paramyxovirus
- b) Rinovirus
- c) Metamyxovirus
- d) Aviadenovirus
- e) Rabdovirus

190. Intrebarea nr. 190: I418 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Semnul clinic caracteristic pentru rinoviroza este:

- a) febra 39-40°C
- b) tuse latratoare
- c) durere retrosternala
- d) rinoree abundenta din prima zi
- e) dureri la deglutitie

191. Intrebarea nr. 191: I419 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
In rhinoviroze se afecteaza:

- a) mucoasa nazală
- b) traheia
- c) laringele
- d) bronhiile
- e) bronsiolele

192. Intrebarea nr. 192: I420 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
In patogenia rinovirozelor este caracteristic toate in afara de :

- a) afectarea celulelor epiteliale a mucoasei nazale

- b) afectarea epitelului bronhiilor si bronhiolelor
- c) adenopatie cervicala
- d) afectarea parenchimului pulmonar
- e) amigdalita

193. Intrebarea nr. 193: I421 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Ce nu se intalneste in tabloul clinic al rinovirozelor ?

- a) traheita
- b) bronsita
- c) cefalee
- d) eliminari abundente din prima zi
- e) subfebrilitate

194. Intrebarea nr. 194: I422 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
In patogenia rinovirozelor este caracteristic:

- a) afectarea celulelor epiteliale a mucoasei nazale
- b) afectarea epitelului bronhiilor si bronhiolelor la copii
- c) adenopatie inghinala
- d) afectarea parenchimului pulmonar
- e) dilatarea si pletora vaselor

195. Intrebarea nr. 195: I423 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Tabloul clinic al rinovirozelor nu include:

- a) cefalee difuza
- b) traheita
- c) sclerita
- d) bronsita
- e) conjunctivita

196. Intrebarea nr. 196: I424 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
In rinoviroze se afecteaza toate cu exceptia?

- a) laringe
- b) bronhii
- c) bronsiole
- d) mucoasa nazala
- e) epitelul bronhiilor si bronhiolelor

197. Intrebarea nr. 197: I425 **Capitol:** gripa si IRVA **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Tabloul clinic in rinoviroze se manifesta prin:

- a) febra inalta
- b) temperatura normala sau subfebrilitate
- c) stranuturi frecvente
- d) eliminari abundente din 1 zi
- e) traheita

198. Intrebarea nr. 198: I98 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
Virusul HIV este:

- a) Herpesvirus
- b) Flavivirus
- c) Lentivirus
- d) Oncovirus
- e) Arbovirus

199. Intrebarea nr. 199: I99 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatia corecta referitoare la virusul HIV:

- a) Este rezistent la dezinfectantele uzuale
- b) Afecteaza exclusiv celulele mononucleare
- c) Penetrarea in celula este conditionata de existenta receptorilor celulari CD4
- d) Penetrarea in celula este conditionata de existenta receptorilor celulari CD8
- e) Are capacitate de reproducere extracelulara

200. Intrebarea nr. 200: I101 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

O mama **nu** poate transmite propriului copil virusul HIV:

- a) In perioada intrauterina
- b) In perioada intranatala
- c) Prin lapte
- d) In timpul operatiei de Cezariana
- e) Cu ocazia ingrijirilor curente

201. Intrebarea nr. 201: I102 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Prin ce se caracterizeaza stadiul latent al infectiei cu HIV

- a) Scadere ponderala 10% din greutatea anterioara
- b) Lipsa manifestarilor clinice si $CD4 > 500/mL$
- c) Limfadenopatie persistenta si $200/mL < CD4 < 500/mL$
- d) Lipsa manifestarilor clinice si $CD4 < 200/mL$
- e) Candidoza orofaringiana persistenta, greu tratabila

202. Intrebarea nr. 202: I103 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In ce caz la pacienții HIV-pozitivi infectia se considera a fi oportunistă:

- a) Primoinfectia la un pacient compromis imunologic
- b) Reactivarea infectiei cronice la un pacient necompromis imunologic
- c) Infectarea cu germeni are loc in antecedente dar se manifesta mai tarziu, in conditii de imunodepresie
- d) Infectiile transmise intrauterin
- e) Infectiile care se manifesta in perioada dupa vaccinare

203. Intrebarea nr. 203: I104 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In ce caz testele serologice de diagnostic pot fi "fals negative" in infectia cu HIV:

- a) La gravide
- b) In primele 2-4 saptamani de infectie
- c) La nou-nascuti
- d) In faza terminala a stadiului SIDA
- e) In infectii autoimune

204. Intrebarea nr. 204: I105 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In ce caz pot fi rezultate "fals pozitive" la metodele de serodiagnostic uzuale in infectia cu HIV:

- a) La gravide
- b) La nou-nascutii pana la varsta de 18 luni din mame HIV-seropozitive
- c) In primele 2-4 luni de infectie
- d) In perioada sindromului acut retroviral (primoinfectie)
- e) La copiii pana la varsta de 4 ani nascuti din mame HIV-seropozitive

205. Intrebarea nr. 205: I106 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce patologii oro-faringiene **nu** sugereaza o infectie cu HIV

- a) Leziuni herpetice persistente sau recidivante
- b) Leziuni vasculare Kaposi
- c) Leucoplachie paroasa a limbii
- d) Candidoza persistenta, rezistenta la tratament
- e) Abces paratonzilar

206. Intrebarea nr. 206: I107 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati ce afectiuni ale SNC sunt sugestive pentru infectia HIV/SIDA

- a) toxoplasmoza SNC
- b) meningoencefalita tuberculoasa
- c) meningita meningococica
- d) meningita enterovirala
- e) limfom cerebral primar

207. Intrebarea nr. 207: I108 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care sunt manifestarile clinice si de laborator mai frecvente in primoinfectia cu HIV (sindrom acut retroviral)

- a) Manifestari clinice similare celor din mononucleoza acuta
- b) Prezenta dereglarilor dispeptice
- c) Leucopenie
- d) Sarcom Kaposi
- e) Pneumonia cu Pneumocistis carinii

208. Intrebarea nr. 208: I109 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In SIDA pot aparea multiple neoplazii, sugestive fiind doar

- a) Osteosarcomul de cavum
- b) Sarcomul Kaposi
- c) Limfomul cerebral primar
- d) Limfom Hodgkin
- e) Limfom nehodgkinian

209. Intrebarea nr. 209: I110 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce pneumonii sunt sugestive pentru stadiul de SIDA:

- a) Pneumonia cu Mycoplasma pneumoniae
- b) Candidoza pulmonara
- c) Pneumonie cu Pneumocystis carinii
- d) Pneumonie gripala
- e) Pneumonia cu adenovirala

210. Intrebarea nr. 210: I111 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce manifestari clinice sunt sugestive pentru stadiul de SIDA:

- a) Candidoza orofaringeana
- b) Encefalopatie HIV
- c) Tuberculoza cu orice localizare
- d) Infectie cu HSV precum ulceratie cronica >1 luna sau esofagita, sau bronșita, sau pneumonie
- e) Infectie cu HZV unidermatomala

211. Intrebarea nr. 211: I112 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce manifestari clinice sunt sugestive pentru stadiul de SIDA:

- a) Limfom cerebral primar
- b) Candidoza esofagiana sau traheobronșica
- c) Toxoplasmoza cerebrala
- d) Simptome constitutionale (febra ≥ 38 sau diaree >1 luna)
- e) Sindrom mononucleozic

212. Intrebarea nr. 212: I113 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce manifestari clinice caracterizeaza casexia provocata de HIV din stadiul SIDA:

- a) Pierdere involuntara >10% din masa corporala
- b) Diaree cronica ≥ 30 zile sau febra intermitenta/constanta ≥ 30 zile
- c) Absenta altor infectii care ar explica pierderea in greutate
- d) Prezenta infectiilor oportuniste
- e) Lipsa diareei cronice sau febrei intermitente/constante

213. Intrebarea nr. 213: I114 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce manifestari nespecifice sunt sugestive pentru infectia cu HIV:

- a) Febra persistenta mai mult de o luna
- b) Diaree persistenta mai mult de o luna
- c) Sindrom mononucleozic cu leucocitoza
- d) Scadere ponderala peste 10% din masa corporala initiala
- e) Pneumonie postgripala

214. Intrebarea nr. 214: I115 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care agenti patogeni sunt considerati oportunisti in infectia cu HIV/SIDA:

- a) Pneumocystis carinii
- b) Toxoplasma gondii
- c) CMV
- d) Meningococcul
- e) Pneumococcul

215. Intrebarea nr. 215: I116 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce teste de diagnostic se aplica in depistarea infectiei cu HIV

- a) ELISA
- b) Culturi embrionale
- c) Insamantari pe bulion de selectie
- d) PCR
- e) Western-blot

216. Intrebarea nr. 216: I117 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatiile corecte referitoare la tratamentul antiviral in infectia cu HIV:

- a) Se administreaza ca profilaxia postexpunere
- b) Se administreaza doar un singur inhibitor de reverstranscriptaza la toti pacientii netratati anterior
- c) Este contraindicat pacientilor in stadiul SIDA avansata
- d) Se indica la pacientii cu CD4 scazut < 200 celule cu sau fara manifestari clinice severe
- e) Se recomanda gravidelor in scop profilaxic a infectiei HIV la noul-nascuti

217. Intrebarea nr. 217: I118 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Sunt considerati "grupa de risc" pentru infectia cu HIV:

- a) Personalul medico-sanitar
- b) Rudele bolnavilor de SIDA
- c) Pacientii ce necesita hemotransfuzii repetate
- d) Homosexualii
- e) Gravidele

218. Intrebarea nr. 218: I119 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In tabloul biologic al bolii SIDA s-au descris:

- a) Scaderea numarului total de limfocite
- b) Scaderea reactivitatii IDR la PPD (proba Mantu)
- c) Cresterea raportului limfocite T CD4+/T CD8+
- d) Hipergammaglobulinemie policlonala (mai ales IgG ei IgA)
- e) Leucocitoza pronuntata

219. Intrebarea nr. 219: I120 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce afectiuni ale SNC sunt sugestive pentru infectia cu HIV/ SIDA:

- a) Encefalita toxoplasmica la adulti
- b) Meningite cu criptococc
- c) Encefalopatia spongioforma
- d) Meningita enterovirala
- e) Meningoencefalita cu M.tuberculosis

220. Intrebarea nr. 220: I121 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Tratamentul infectiei cu HIV/SIDA se face cu:

- a) Inhibitori nucleozidici de reverstranscriptaza
- b) Inhibitori de proteaza
- c) Inhibitori de hemaglutinina
- d) Inhibitori de neuraminidaza
- e) Inhibitori nonnucleozidici de reverstranscriptaza

221. Intrebarea nr. 221: I122 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce sunt caracteristice pentru primoinfectia HIV (sindromul acut retroviral)

- a) Clinic poate evolua ca un sindrom pseudomononucleozic
- b) Simptomatologia clinica dureaza in mediu 2-4 saptamani
- c) Intotdeauna se remarca o leucocitoza cu neutrofiloza si deviere spre stanga
- d) Apare la 5-30 zile de la infectare
- e) Sindrom nefrotic

222. Intrebarea nr. 222: I123 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati trasaturile caracteristice primoinfectiei HIV (sindrom acut retroviral)

- a) Intotdeauna evoluiaza foarte sever
- b) Manifestarile clinice dureaza luni de zile
- c) ELISA si Westrn-Blot pot fi fals negative
- d) Cantitatea de ARN viral mult crescuta
- e) Nu se manifesta in 100% din cazurile infectate

223. Intrebarea nr. 223: I124 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatiile corecte referitoare la infectia cu Herpes Zoster :

- a) la pacientii imunodeprimati virusul Herpes Zoster poate duce nu numai la manifestari cutanate, ci si la pneumonii interstițiale micronodulare bilaterale, meningoencefalite
- b) la copii contactati cu pacientii cu Herpes Zoster poate sa declanșeze varicela
- c) frecvent se depisteaza la copii si adolescenti
- d) agentul patogen al Herpes Zoster este acelasi ca si in Herpes Simplex
- e) Herpes Zoster multidermatomal este un indice pentru investigarea pacientului la HIV-infectie

224. Intrebarea nr. 224: I375 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Infecția oportunistă pulmonară in SIDA cel mai des poate fi provocata de:

- a) candida albicans
- b) salmonella
- c) pneumocystis carini
- d) toxoplasma gondii
- e) papavavirus

225. Intrebarea nr. 225: I376 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Ce patologii nu sugereaza o infectie HIV:

- a) displazie cervicala
- b) angiomatoza bacilara
- c) scabia
- d) limfomul Burkitt
- e) histoplasmoza diseminata

226. Intrebarea nr. 226: I377 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Cel mai exact indice de prognostic pentru HIV:

- a) limfocitoza
- b) limfopenie
- c) pancitopenie
- d) scaderea nivelului de limfocite CD4
- e) cresterea nivelului de limfocite CD8

227. Intrebarea nr. 227: I378 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Indicati afirmatia corecta referitor la HIV:

- a) penetrarea in celula este conditionata de existenta receptorilor CD4
- b) penetrarea in celula este conditionata de existenta receptorilor CD8
- c) este rezistent la mediul extern
- d) contine neuroaminidaza
- e) contine hemaglutinaza

228. Intrebarea nr. 228: I379 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Forma cerebrala de SIDA este provocata cel mai des de:

- a) meningococ
- b) toxoplazmoza
- c) bruceleza
- d) streptococ
- e) leptospira

229. Intrebarea nr. 229: I380 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Tratamentul pentru HIV infectie și infectiile oportuniste ale acesteia include :

- a) citostatice
- b) medicamente antiretrovirale
- c) medicamente antibacteriene
- d) medicamente antifungice
- e) imunomodulatoare

230. Intrebarea nr. 230: I381 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Modificări în analiza generală a sîngelui la HIV infectați categoria B :

- a) leucocitoză
- b) limfocitoză
- c) limfopenie
- d) leucopenie
- e) monopenie

231. Intrebarea nr. 231: I382 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Grupele de risc pentru infectia HIV :

- a) consumatorii de droguri pe cale intravenoasă

- b) persoanele recipiente de organe sau spermă de la donatorii necontrolați
- c) persoanele promixe
- d) persoanele care frecventează bazinele publice
- e) persoanele ospătoriilor unde se alimentează persoane infectate

232. Intrebarea nr. 232: I383 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
HIV conține următoarele antigene :

- a) Revertranscriptaza
- b) ARN
- c) Hemaglutinina
- d) Ag O
- e) proteina 8

233. Intrebarea nr. 233: I384 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Ce manifestări sunt sugestive pentru infecția HIV:

- a) febra persistentă ce depășește 3-4 săptămâni
- b) adaos ponderal
- c) limfadenopatie unilaterală submandibulară
- d) transpirații nocturne
- e) splenomegalie

234. Intrebarea nr. 234: I385 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Căile de transmitere în infecția HIV sunt:

- a) paranterală
- b) alimentară
- c) vertical
- d) sexuală
- e) prin aerosol

235. Intrebarea nr. 235: I386 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Afecțiuni cutaneomucoase sugestive pentru HIV infecție:

- a) infecția cu papilomavirus
- b) leucoplazie păroasă a limbii
- c) eritrodermie psoriazică
- d) herpes zoster primar unidermatomal la adult
- e) dermatită seboreică

236. Intrebarea nr. 236: I387 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici
Agenți patogeni în forma clinică intestinală ale SIDA:

- a) cryptosporidia
- b) legionella
- c) aspergillus

- d) candida
- e) salmonella

237. Intrebarea nr. 237: I388 **Capitol:** HIV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** e.mihnevici

Indicați celulele ce reprezintă rezervorul de HIV în organism:

a) epitelioficii tractului respirator superior

- b) macrofagii
- c) celulele insulelor Langerhans
- d) hepatociții
- e) celulele dentritice

238. Intrebarea nr. 238: I126 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati marcherul serologic ce se depisteaza in ser in caz de hepatita virala acuta A:

- a) anti-HAV IgG
- b) Ag HAV
- c) anti-HAV IgM
- d) Ag HBe
- e) anti-HEV IgM

239. Intrebarea nr. 239: I127 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care virusuri are un genom tip ADN:

- a) VHA
- b) VHB
- c) VHC
- d) VHD
- e) VHE

240. Intrebarea nr. 240: I128 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatia corecta privitoare la virusurile hepatice:

- a) VHA este distrus la fierbere in 5 minute
- b) Rezistenta VHA este mai mare decat VHB
- c) VHB nu este rezistent la tratarea instrumentarului medical cu alcool
- d) VHB este distrus la fierbere in mai putin de 20-30 minute
- e) VHB nu se distruge la autoclavare

241. Intrebarea nr. 241: I129 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatia corecta referitoare la epidemiologia hepatitelor virale:

- a) HVA este o zooantroponoza
- b) Sursa de VHB este reprezentata de bolnavii de toate categoriile de evolutie a infectiei
- c) VHE este transmis pe cale parenterala
- d) Receptivitatea fata de VHE nu este generala
- e) Curba de imbolnavire prin VHA nu depinde de sezon

242. Intrebarea nr. 242: I130 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatia corecta referitoare la epidemiologia hepatitelor virale:

a) Hiperendemicitatea HVA este confirmata in conditii deficitare socio-economice si de igiena

precara

- b) Receptivitatea fata de virusul HVA nu este generala
- c) Sursa de infectie in HVE poate fi omul bolnav cu HVE cronica
- d) Transmiterea VHD este similara cu cea in HVE
- e) Viremia cu VHA este de lunga durata, pana la 2-3 luni dupa debutul bolii

243. Intrebarea nr. 243: I131 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatia corecta referitoare la epidemiologia hepatitelor virale:

- a) In HVA perioada de incubatie dureaza 7-70 zile
- b) In HVB perioada de incubatie dureaza 30-120 zile
- c) Calea de molipsire prin VHC este similara cu cea din HVE
- d) Doza de infectare in HVC este mult mai mare comparativ cu HVB
- e) Transmiterea VHE pare favorizata de mediul acvatic

244. Intrebarea nr. 244: I132 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatia corecta privitoare la simptomatologia preicterica a hepatitelor acute virale:

- a) Artralgiile se intalnesc frecvent in HVA si HVE
- b) Cresterea ALAT nu-i caracteristica perioadei preicterice
- c) Artritele sunt caracteristice HVC
- d) Coma hepatica de gradul I-II se poate instala si in perioada preicterica
- e) Stabilirea diagnosticului etiologic al hepatitelor virale in perioada preicterica se face in baza testelor serologice specifice

245. Intrebarea nr. 245: I133 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati semnul clinic si de laborator ce se intalneste frecvent in perioada preicterica a HVB

- a) Sclerita
- b) Poliartrita
- c) anti-HBc IgM pozitiv
- d) Lombalgii
- e) Bilirubina totala 35 mkm/l

246. Intrebarea nr. 246: I134 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care din afirmatiile referitoare la tratamentul hepatitelor acute virale **nu** este corecta:

- a) Se recomanda dieta hipocalorica
- b) Repausul la pat este esential pentru vindecare
- c) Pacientul respecta regimul alimentar si de munca pana la normalizarea ALAT
- d) Nu exista tratament etiotrop pentru HV de tip B sau C
- e) Corticoterapie este indicata in formele fulminante de HV

247. Intrebarea nr. 247: I135 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatia **falsa** referitoare la evolutia hepatitelor virale acute:

- a) > 90% din pacientii cu HVB acuta se vindeca
- b) HVA nu se cronicizeaza
- c) Mortalitatea in HVE poate atinge 10-20% la gravide
- d) Probabilitatea de cronicizare in coinfectia B si D este mai mare comparativ cu suprainfectia D
- e) Hepatita virala acuta C se cronicizeaza in > 50-70% cazuri

248. Intrebarea nr. 248: I136 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatia **falsa** privitoare la simptomatologia preicterica a hepatitelor acute virale:

- a) Este sistemica si variabila
- b) Anorexia, greata, fatigabilitatea preced icterul in majoritatea cazurilor
- c) Febra inalta (38-39 C) se intalneste mai frecvent in HVB si HVC
- d) Scaunele aholice pot precede instalarea icterului tegumentar
- e) Hepatomegalia poate fi depistata in perioada preicterica

249. Intrebarea nr. 249: I138 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatia **falsa** referitoare la evolutia hepatitelor virale acute:

- a) Mortalitatea in HVA este mai mare la gravide in ultimul trimestru de sarcina
- b) Suprainfectia cu VHD creste riscul de cronicizare in HVB
- c) HVE nu se cronicizeaza
- d) Riscul aparitiei hepatocarcinomului primar este mai mare la purtatorii cronici de VHB si VHC
- e) Persistenta HBeAg >3 luni este un indicator al cronicizarii HVB

250. Intrebarea nr. 250: I139 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatia corecta referitoare la evolutia hepatitelor virale acute:

- a) Coma hepatica mai frecvent se instaleaza la pacientii cu HVC comparativ cu HVB
- b) Riscul de cronicizare in HVD coinfectie este mult mai mare comparativ cu HVB acuta
- c) Hemoragiile uterine sunt una din cauzele de deces a gravidelor cu HVE acuta
- d) Probabilitatea de cronicizare in HVC > HVD coinfectie > HVD suprainfectie
- e) Hepatocarcinomul hepatic primar este frecvent diagnosticat la pacientii cu HVE cronica

251. Intrebarea nr. 251: I140 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In cazul unui copil nascut din mama purtatoare de HBsAg se va lua urmatoarea masura de profilaxie postexpunere:

- a) Administrare de vaccin genoingineric anti HVB
- b) Administrare de vaccin viu anti HVB
- c) Administrare de PegIntron copilului din primele clipe dupa nastere
- d) Administrarea doar de imunoglobuline specifice este suficienta ca masura de profilaxie
- e) Administrarea doar de antivirale si imunoglobuline specifice este suficienta ca masura de profilaxie

252. Intrebarea nr. 252: I141 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care din virusuri are un risc mai mare de transmitere perinatale

- a) VHA
- b) VHB
- c) VHA+VHC
- d) VHC
- e) VHE

253. Intrebarea nr. 253: I142 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care din markerii serologici ai HVB indica la o probabila evolutie acuta a infectiei:

- a) HBsAg
- b) anti HBe
- c) Anti HBc IgG
- d) HBeAg
- e) Anti HBc IgM in titru mare

254. Intrebarea nr. 254: I143 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care din indicii serologici sau biochimici indica la o evolutie acuta a HV:

- a) Imunoglobulinele specifice clasa M in titru mare
- b) Majorarea ALAT
- c) Bilirubinemia

- d) Majorarea reactiei cu timol
- e) Indicele protrombinic scazut

255. Intrebarea nr. 255: I144 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati ce medicatie se indica in tratamentul HVB cronice

- a) Preparatele din grupul Interferonilor + Ribavirina
- b) Preparatele din grupul Interferonilor + Lamivudina
- c) Ribavirina + Lamivudina
- d) Preparatele din grupul Interferonilor + Oseltamivir
- e) Preparatele din grupul Interferonilor + Glucocorticoizi

256. Intrebarea nr. 256: I145 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati ce medicatie se indica in tratamentul HVC cronice

- a) Preparatele din grupul interferonilor + Ribavirina
- b) Preparatele din grupul Interferonilor + Lamivudina
- c) Preparatele din grupul Interferonilor + Oseltamivir
- d) Preparatele din grupul Interferonilor + Glucocorticoizi
- e) Ribavirina + Lamivudina

257. Intrebarea nr. 257: I146 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati modificarea ce indica la o evolutie spre necroza hepatica acuta in cazul hepatitei virale fulminante:

- a) majorarea ALAT >12 ori
- b) hiperbilirubinemia
- c) scaderea progresiva a indicelui protrombinic
- d) HBeAg pozitiv in titru mare
- e) hipergamaglobulinemia

258. Intrebarea nr. 258: I147 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati ce markeri biochimici, serologici sau virusologici confirma diagnosticul de HVC cronica:

- a) ALAT in limitele normei; anti HCV IgM- pozitiv, ARN-HCV - pozitiv
- b) ALAT in limitele normei; anti HCV IgG pozitiv, ARN-HCV - negativ
- c) cresterea ALAT, anti HCV-IgG pozitiv; ARN-HCV - pozitiv
- d) cresterea ALAT; antiHCV IgM - pozitiv; ARN-HCV - pozitiv
- e) cresterea ALAT; anti HCV-IgG pozitiv; ARN-HCV - negativ

259. Intrebarea nr. 259: I148 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati ce marker indica o imunitate formata in urma vaccinarii anti hepatita B

- a) AgHBs
- b) Anti HBe
- c) Anti HBc
- d) Anti HBs
- e) Anti HBc + Anti HBs

260. Intrebarea nr. 260: I149 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati prezenta carui sindrom permite diferentierea hepatitei virale acute de tip A de cea de tip B:

- a) Pseudogripal
- b) Dispeptic
- c) Colestatic
- d) Icteric
- e) Hepatopriv

261. Intrebarea nr. 261: I150 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati trasatura caracteristica HVD suprainfectiei:

- a) Infectia cu VHD induce cresterea sintezei de VHB
- b) Evolutia cronica se constata in 10-20% cazuri
- c) Intotdeauna se depisteaza AgHBe pozitiv
- d) Aparitia precoce a sindromului edematos-ascitic in cazurile grave
- e) Gradul hepatomegaliei ajuta la diferentierea suprainfectiei de coinfectie

262. Intrebarea nr. 262: I151 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati trasatura caracteristica HVC:

- a) Ponderea inalta a imbolnavirilor perinatale
- b) Tendinta evolutiva catre persistenta infectiei si cronicizare in 10-20% cazuri
- c) Ponderea inalta a formelor fulminante
- d) Pacientii purtatori cronici de HCV nu au riscul aparitiei hepatomului primar
- e) VHC se poate multiplica in hepatocite, monocucleare, limfocite T si B

263. Intrebarea nr. 263: I152 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce indice ajuta in monitorizarea de zi cu zi a comei hepatice

- a) Bilirubina
- b) Indicele protrombinic
- c) Reactia cu timol
- d) Gama globulinele
- e) ALAT

264. Intrebarea nr. 264: I153 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In ce caz de hepatita virala pot fi administrati corticoizii:

- a) HVB cronica
- b) Ciroza hepatica C decompensata
- c) Coma hepatica
- d) HVC acuta de gravitate medie
- e) HVB acuta de gravitate medie

265. Intrebarea nr. 265: I154 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce indice de laborator permite de a suspecta carcinomul hepatic primar la un pacient cu hepatita virala B cronica

- a) Majorarea ALAT
- b) Micsorarea beta lipoproteidelor
- c) Majorarea alfa fetoproteinei
- d) Cresterea gama glutamiltranspeptidazei
- e) Disproteinemia

266. Intrebarea nr. 266: I155 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In ce material biologic se detecteaza mai frecvent VHD:

- a) Sputa
- b) Materii fecale
- c) Saliva
- d) Sange
- e) Urina

267. Intrebarea nr. 267: I156 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati afirmatiile corecte privind patogenia hepatitelor virale:

- a) VHA se multiplica primar in orofaringe, epiteliul jejunal
- b) In HVB multiplicarea intrahepatica a virusurilor nu conduce direct la leziuni distructive celulare
- c) HVA si HVC au o evolutie autolimitata
- d) Afectarea extrahepatica prin complexe imune celulare nu este caracteristica HVA
- e) VHE poate induce aparitia hepatocarcinomului primar

268. Intrebarea nr. 268: I157 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati factorii care determina evolutia bolii in hepatitele virale

- a) Tipul de virus hepatic
- b) Capacitatea de reactie imuna
- c) Mecanismul de transmitere
- d) Interferarea cu alti factori (coinfectii, suprainfectii)
- e) Durata perioadei de incubatie

269. Intrebarea nr. 269: I158 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati sindroamele si modificarile de laborator prin care se exprima suferinta celulara in hepatitele virale acute

- a) Sindrom de citoliza
- b) Sindrom hepatopriv prin dereglarea functiei de sinteza
- c) Pierderea selectivitatii de permeabilitate membrana pentru bilirubina conjugata
- d) Hipergamaglobulinemie pronuntata >30%
- e) Anemie hemolitica

270. Intrebarea nr. 270: I159 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatiile corecte privind contagiozitatea si caile de transmitere in hepatita virala

- a) Bolnavul cu hepatita tip A este contagios doar in perioada icterica
- b) Pericolul de transmitere a infectiei in perioada intranatala este mai mare la gravidele HBe Ag pozitive
- c) Contagiozitatea bolnavului cu hepatita tip B este ultimele 2-3 saptamani de incubatie pana la sfarsitul bolii
- d) In HVB acuta eliminarea fecala a virusului dureaza toata perioada de stare
- e) Calea de transmitere in HVC nu poate fi reconstituita in toate cazurile

271. Intrebarea nr. 271: I160 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care dintre manifestarile de mai jos sunt compatibile cu debutul unei hepatite acute virale:

- a) Hipercomia urinei
- b) Febra tip hectic

- c) Diaree tranzitorie
- d) Fatigabilitate, astenie
- e) Dureri surde in subbordul costal drept

272. Intrebarea nr. 272: I161 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Hepatomegalia din hepatita acuta virala se recunoaste prin:

- a) Are consistenta crescuta, suprafata neregulata
- b) Este sensibila la palpare
- c) Este prezenta in toate cazurile evolutive (tipice si atipice)
- d) Nu este marita proportional cu severitatea bolii
- e) Este palpabila din perioada preicterica

273. Intrebarea nr. 273: I162 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Icterul din hepatita acuta virala forma tipica se caracterizeaza prin:

- a) Bilirubinemie preponderent pe contul fractiei directe
- b) Hiperhromia urinei precede aparitia icterului tegumentar
- c) Prurit cutanat
- d) Anemie concomitenta
- e) Cresterea urobilinogenului seric si urinar

274. Intrebarea nr. 274: I163 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Hepatitele virale acute cu prezenta sindromului colestatic se confirma prin:

- a) Hiperbilirubinemie neconjugata
- b) Clinic - prurit cutanat
- c) Cresterea moderata a beta-lipoproteidelor
- d) Cresterea moderata a fosfatazei alcaline
- e) Micsorarea indicelui protrombinic

275. Intrebarea nr. 275: I164 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In cazul repetarii hepatitei la aceeasi persoana poate fi vorba de:

- a) Reinfectie cu alt virus hepatic
- b) Reinfectie cu acelasi virus in caz de HVA
- c) Acutizarea unei forme latent evolutive
- d) Supra-infectia cu al doilea virus (D plus B)
- e) Raspunsul organismului la introducerea vaccinului impotriva HVB

276. Intrebarea nr. 276: I165 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce tratament se aplica in cazurile grave de hepatita virala:

- a) Antibiotice cu spectru larg de actiune in doze mari
- b) Inhibitori de proteaze
- c) Tratament de dezintoxicare
- d) Corticoterapia
- e) Administrarea de vaccin specific

277. Intrebarea nr. 277: I166 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Caror pacienti cu hepatita virala le este contraindicat tratamentul cu interferoni:

- a) Pacientilor ce sufera de depresii, in special cu antecedente de suicid
- b) Pacientilor cu maladii autoimune concomitente

- c) Pacientilor cu colecistita cronica
- d) Pacientilor cu leucopenie si trombocitopenie severa
- e) Pacientilor cu pielonefrita cronica

278. Intrebarea nr. 278: I167 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In ce caz nu se recomanda tratamentul cu interferoni:

- a) Ciroza hepatica decompensata
- b) Hepatita virala B cronica activa
- c) Hepatita virala B cronica fara activitate clinico-biochimica
- d) Hepatita virala A evolutie trananta
- e) Hepatita virala C evolutie trananta, cu nivel inalt de viremie

279. Intrebarea nr. 279: I168 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care dintre testele urmatoare nu indica natura (etiologia) suferintelor hepato-celulare:

- a) Micsorarea indicelui protrombinic
- b) Majorarea ALAT
- c) Bilirubinemia
- d) Depistarea anti HBc IgM
- e) Depistarea anti HAV IgM

280. Intrebarea nr. 280: I169 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati formele de evolutie atipica a hepatitelor virale acute:

- a) Inaparenta
- b) Icterica
- c) Anicterica
- d) Subclinica
- e) Prodromala

281. Intrebarea nr. 281: I170 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati trasaturile caracteristice formei inaparente de HV acuta

- a) Prezenta sindromului citolitic
- b) Aparitia antigenelor / anticorpilor specifici
- c) Absenta hepatosplenomegaliei
- d) Absenta icterului
- e) Micsorarea indicelui protrombinic

282. Intrebarea nr. 282: I171 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati trasaturile caracteristice formei anicterice de HV acuta

- a) Prezenta sindromului citolitic
- b) Prezenta sindromului hepatopriv
- c) Hepatosplenomegalia
- d) Hiperbilirubinemia
- e) Prezenta SCID (sindromul de coagulare intravasculara diseminata)

283. Intrebarea nr. 283: I172 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati trasaturile caracteristice formei subclinice de HV acuta

- a) Prezenta sindromului citolitic slab pronuntat

- b) Prezenta sindromului dispeptic in perioada prodromala
- c) Hepatosplenomegalia
- d) Aparitia antigenelor / anticorpilor specifici
- e) Absenta icterului

284. Intrebarea nr. 284: I173 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati trasaturile caracteristice formei fruste de HV acuta

- a) Prezenta hiperbilirubinemiei nepronuntate
- b) Prezenta sindromului citolitic slab pronuntat
- c) Prezenta hepatomegaliei usor pronuntate
- d) Aparitia sindromului hemoragic
- e) Aparitia sindromului edematos-ascitic

285. Intrebarea nr. 285: I174 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care date clinice si de laborator indica la gravitatea bolii in cazul HV:

- a) Balonarea abdomenului si reaparitia durerilor in subbordul costal drept
- b) Majorarea ALAT
- c) Prezenta hepatosplenomegaliei
- d) Agravarea starii generale in perioada icterica
- e) Aparitia sindromului hemoragic

286. Intrebarea nr. 286: I175 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatiile corecte privitor la tratamentul hepatitelor virale

- a) Glucocorticoizii se administreaza in majoritatea cazurilor de hepatita virala cronica activa
- b) Zefixul, adefovirul, entecavirul si interferonii sunt antiviralele ce se folosesc in tratamentul HVB sau HVD
- c) Ribavirina si interferonii sunt antiviralele ce se administreaza pacientilor cu HVC
- d) Inhibitorii de proteaza sunt obligatoriu indicati pacientilor cu hepatita virala cu evolutie severa
- e) In HVA evolutie trenata se recomanda administrarea de Zefix sau Ribavirina

287. Intrebarea nr. 287: I176 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati trasaturile caracteristice formelor fulminante de hepatita virala

- a) Formele fulminante sunt mult mai frecvente in HVC comparativ cu HVB
- b) Modificarile neuropsihice evoluiaza odata cu agravarea bolii
- c) Monitorizarea zilnica a indicelui protrombinic permite de a aprecia corect gravitatea bolii
- d) Monitorizarea zilnica a ALAT permite de a aprecia corect gravitatea bolii
- e) Toti pacientii care au supravietuit hepatitei fulminante cu VHB rareori fac forme cronice

288. Intrebarea nr. 288: I177 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care dintre cele enumerate ne permit de a suspecta o suferinta hepatica cronica

- a) Hipergamaglobulinemia
- b) Ficat de consistenta crescut
- c) Prezenta sindromului edematos-ascitic
- d) Cresterea considerabila a ALAT
- e) Cresterea fosfatazei alcaline

289. Intrebarea nr. 289: I178 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care din urmatoarele afirmatii referitoare la VHA sunt adevarate:

- a) Este un virus ADN
- b) Este cunoscut un singur antigen specific fixat de membrana externa
- c) Este distrus la fierbere timp de 5 minute
- d) Inactivarea VHA se poate obtine prin contactul acestuia cu concentratii mari de clorol
- e) Izolarea VHA in culturi este o metoda uzuala de diagnostic

290. Intrebarea nr. 290: I179 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care din afirmatii referitoare la HVA sunt corecte:

- a) Are o perioada de incubatie de 15 - 45 zile
- b) Virusul are actiune directa citolitica asupra hepatocitelor
- c) Virusul este prezent in bila, materii fecale, sange spre sfarsitul perioadei de incubatie
- d) Replicarea virusului se produce la nivel hepatic, in limfocite T-helper, in celule stem
- e) In perioada icterica VHA nu se detecteaza in tesutul hepatic

291. Intrebarea nr. 291: I180 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care din afirmatiile referitoare la diagnosticul serologic al HVA sunt corecte:

- a) Anti-HVA IgM pot persista in sange pana la 3-6 luni
- b) Titrurile inalte de Anti-HVA IgG semnifica o infectie cronica
- c) Titrurile inalte de Anti-HVA IgM semnifica o infectie acuta
- d) Pacientii primar diagnosticati cu Anti-HVA IgG pozitivi sunt obligatoriu examinati la ARN HVA
- e) Anticorpzii Anti-HVA IgG raman detectabili in ser un timp nedefinit si asigura protectia impotriva reinfectarii

292. Intrebarea nr. 292: I181 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati caracteristicile corecte privind hepatita virala A

- a) Evoluiaza cel mai des infraclinic (atipic)
- b) Cronicizeaza la sugari
- c) In regiunile endemice afecteaza mai ales copiii
- d) Are prevalenta sezoniera de vara-toamna
- e) Are o perioada de incubatie peste 60 zile

293. Intrebarea nr. 293: I182 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati sindroamele clinice caracteristice perioadei preicterice in HVA:

- a) Sindrom dispeptic
- b) Sindrom colestatic
- c) Sindrom artralgie
- d) Sindrom de intoxicatie
- e) Sindrom pseudogipal

294. Intrebarea nr. 294: I183 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care din afirmatii referitoare la VHB sunt corecte:

- a) Este un virus ARN
- b) Ag HBc este o proteina nucleocapsidica frecvent detectata in sangele periferic la pacientii cu HVB acuta

- c) Primul marker viral detectabil in ser este HBsAg
- d) VHB poate fi detectat in sangele periferic din perioada de incubatie
- e) AntiHBs confirma imunitatea organismului fata de VHB

295. Intrebarea nr. 295: I184 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatiile corecte referitoare la diagnosticarea de laborator a HVB

- a) Cresterea ALAT serice precede aparitia AgHBs in sange
- b) AgHBs este detectabil in ser la >95% din pacientii cu HVB acuta
- c) Aparitia in sange a AgHBe indica trecerea virusului in faza nonreplicativa
- d) Anticorpilor anti-HBe sunt detectabili in ser anterior anticorpilor anti-HBs
- e) Persistenta in ser a AgHBs > 6 luni indica cronicizarea HVB

296. Intrebarea nr. 296: I185 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati manifestarile extrahepatice cauzate de complexe imune celulare din HVB

- a) Colecistite
- b) Crioglobulinemie
- c) Pielonefrite
- d) Poliarterite nodoase
- e) Glomerulonefrite membranoase

297. Intrebarea nr. 297: I186 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In circulatia libera a pacientului cu HVB acuta se pot identifica:

- a) AgHBc
- b) AgHBs
- c) AgHBe
- d) ARN viral
- e) Particule DANE (virion integru)

298. Intrebarea nr. 298: I187 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Semnificatia antigenului HBe este:

- a) Marker de convalescenta
- b) Indice de replicare activa
- c) Risc de evolutie spre marea insuficienta hepatica in formele fulminante
- d) Risc de evolutie cronica la persistenta indelungata
- e) Contagiozitate mare

299. Intrebarea nr. 299: I188 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In cursul infectiei naturale cu VHB apar anticorpilor:

- a) Anti-ARN VHB
- b) Anti-HBs
- c) Anti-HBc
- d) Anti-HBe
- e) Anti-ADN polimeraza

300. Intrebarea nr. 300: I189 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Imunitatea dupa hepatita B este:

- a) Asigurata de anti-HBc
- b) Asigurata de anti-HBs
- c) Specifica pentru virusul B
- d) De durata lunga si nu permite reinfectarea cu VHB
- e) Asigurata de anti-ADN viral

301. Intrebarea nr. 301: I190 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care sunt recomandarile date unui pacient cu hepatita cronica B fara activitate biochimica

- a) Supraveghere dispanserica nu mai putin de o data la 6 luni
- b) Tratament obligatoriu cu antivirale
- c) Vaccinarea impotriva HVB a partenerilor sexuali
- d) Investigarea periodica a alfa-fetoproteinei
- e) Perfuzii intravenoase de aminoacizi

302. Intrebarea nr. 302: I191 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati sindroamele clinice caracteristice perioadei preicterice in HVB:

- a) Sindrom pseudogripal
- b) Sindrom artralgie
- c) Sindrom astenovegetativ
- d) Sindrom dispeptic
- e) Sindrom colestatic

303. Intrebarea nr. 303: I192 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatiile corecte privitoare la HVC:

- a) Se transmite transplacentar on >20% cazuri
- b) Poate avea atat incubatie scurta de 2-4 saptamani, cat si lunga de pana la 180 zile
- c) Dezvolta sindrom citolitic moderat
- d) Poate evolua cronic in 50-70% cazuri
- e) In 5-10% din cazuri dezvolta coma hepatica

304. Intrebarea nr. 304: I193 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Este o caracteristica eronata privind hepatita virala C:

- a) Are prevalenta sezoniera de vara-toamna
- b) Afecteaza mai ales copiii
- c) Transmiterea perinatale este mai mare decat in HVB
- d) Formele cronice cresc riscul hepatomului primar
- e) Formele cronice de HVC se confirma prin ARN-HCV pozitiv in PCR

305. Intrebarea nr. 305: I194 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatiile corecte referitoare la diagnosticarea serologica a HVD

- a) Anti-HBs - pozitiv si anti-HD IgG - pozitiv indica o infectie cronica D
- b) HBsAg - pozitiv, anti-HBc IgG - pozitiv si anti-HD IgM - pozitiv indica o infectie cu VHD cronica
- c) anti-HBc IgM - pozitiv si anti-HD IgM - pozitiv indica o infectie cu VHD acuta, coinfectie
- d) anti-HBc IgG - pozitiv si anti-HD IgM - pozitiv indica o infectie cu VHD acuta, suprainfectie
- e) AgHBs - pozitiv si anti-HD IgG - pozitiv indica o HVD cronica

306. Intrebarea nr. 306: I195 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatiile corecte referitor la virusul hepatic D:

- a) Dezvolta capacitati citopatice in prezenta antiHBs
- b) Este un virus ARN
- c) Se transmite si sexual
- d) Poate infecta numai asociat AgHBs
- e) Poate fi transmis si fecal-oral

307. Intrebarea nr. 307: I196 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Suprainfectia cu VHD la o persoana cu AgHBs pozitiv se caracterizeaza prin:

- a) Evolutie infraclinica (atipica) in majoritatea cazurilor
- b) Transforma portajul asimptomatic in boala clinic manifesta
- c) Clinico-biochimic se manifesta prin hepatita acuta
- d) Decompenseaza o evolutie cronica stabilizata
- e) Stimuleaza reactia de aparare, accelerand vindecarea

308. Intrebarea nr. 308: I197 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Printre semnele clinice ale agravarii starii generale in cazurile fulminante de hepatite virale sunt:

- a) Aparitia pruritului cutanat
- b) Persistenta sau reinstalarea sindromului dispeptic
- c) Sindrom dureros in hipocondriul drept
- d) Somnolenta, apatie, fatigabilitate progresiva
- e) Sindrom meningian pozitiv

309. Intrebarea nr. 309: I198 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati afirmatiile corecte privitoare la HVE:

- a) Virusul se transmite transplacentar in majoritatea cazurilor
- b) Nu exista tratament etiologic
- c) Incubatia este de 4-8 saptamani, in medie 15-40 zile
- d) Riscul letal exista numai la gravide
- e) Se poate croniciza la nou-nascuti

310. Intrebarea nr. 310: I199 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati cauzele posibile de deces a gravidelor cu HVE:

- a) Insuficienta hepatica acuta
- b) Hemoragii intrauterine
- c) Pancreatita acuta
- d) Hemoglobinuria cu dezvoltarea insuficientei renale acute
- e) Meningoencefalita acuta

311. Intrebarea nr. 311: I200 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati sindroamele si modificarile de laborator prin care se exprima suferinta celulara in ciroza hepatica virala decompensata

- a) Sindrom citolitic pronuntat
- b) Sindrom hepatopriv prin dereglarea functiei de sinteza
- c) Disproteinemie

- d) Sindrom mezenchimal-inflamator pronuntat
- e) Sindrom de coagulare intravasculara diseminata

312. Intrebarea nr. 312: I125 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Numiti virusul care se transmite prin mecanism fecal-oral:

- a) VHB + VHD
- b) VHA + VHE
- c) VHC + VHB
- d) VHA + VHD
- e) VHE + VHC

313. Intrebarea nr. 313: I605 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** holban

Selectati din variantele de mai jos hepatitele cu transmitere parenterala :

- a) HVA
- b) HVC
- c) HVD
- d) HVE
- e) HVG

314. Intrebarea nr. 314: I606 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** holban

Selectati grupele de preparate care se indica in tratamentul HVC cornice:

- a) grupul interferonilor
- b) ribavirina
- c) ribavirina + lamivudina
- d) inhibitori de proteaza
- e) ganciclovir

315. Intrebarea nr. 315: I607 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** holban

Selectati grupele de preparate care se indica in tratamentul HVC cornice:

- a) telaprevir
- b) grizeofulvina
- c) amantadine
- d) Peg interferon
- e) ribavirina

316. Intrebarea nr. 316: I608 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** holban

Selectati grupele de preparate care se indica in tratamentul HVC cornice:

- a) amantadine
- b) ganciclovir
- c) boceprevir
- d) Peg interferon
- e) ribavirina

317. Intrebarea nr. 317: I609 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** holban

Cu care din patologiile de mai jos se face diagnosticul diferential al HVB:

- a) mononucleoza infectioasa
- b) leptospiroza

- c) citomegaloviroza
- d) toxiinfectiile alimentare
- e) tetanos

318. Intrebarea nr. 318: I610 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** holban

Cu care din patologiile de mai jos se face diagnosticul diferential al HVB forma grava :

- a) febrele hemoragice
- b) sepsis
- c) leptospiroza
- d) toxiinfectiile alimentare
- e) rabia

319. Intrebarea nr. 319: I611 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** holban

Selectati afirmatiile corecte ce se refera la hepatita virala C :

- a) ARN virus, familia Flaviviridae
- b) ARN virus, familia Picornaviridae
- c) mecanismul de transmitere fecal-oral
- d) perioada de incubatie 50-180 zile
- e) prezenta manifestarilor extrahepatice

320. Intrebarea nr. 320: I612 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** holban

Selectati afirmatiile corecte ce se refera la hepatita virala B:

- a) AND virus, familia Hepadnaviridae
- b) mecanismul de transmitere fecal-oral
- c) mecanismul de transmitere transmisibil
- d) dupa instalare icterului starea generala nu se amelioreaza
- e) dupa instalare icterului starea generala se amelioreaza

321. Intrebarea nr. 321: I613 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** holban

Selectati afirmatiile corecte ce se refera la hepatita virala D:

- a) virus defectiv , tip ARN
- b) mecanismul de transmitere fecal-oral
- c) mecanismul de transmitere transmisibil
- d) perioada de incubatie 45-140 zile
- e) este caracteristica sezonalitatea maladiei

322. Intrebarea nr. 322: I614 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** holban

Care din afirmatiile urmatoare caracterizeaza HVA?

- a) AND virus, familia Hepadnaviridae
- b) profilaxia specifica se face cu vaccin inactivat
- c) vaccinare poate fi propusa persoanelor calatoare in tarile cu nivel igienic precar
- d) sint caracteristice formele cronice
- e) este caracteristica sezonalitatea maladiei

323. Intrebarea nr. 323: I615 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** holban

Indicati din afirmatiile de mai jos formele atipice de HVA:

- a) anicterica
- b) frusta
- c) colestatica
- d) inaparenta
- e) cu sindrom de colestaza

324. Intrebarea nr. 324: I617 **Capitol:** HV **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** holban

Indicati care din afirmatiile de mai jos NU corespund clasificarii HVA:

- a) evolutie acuta
- b) evolutie cronica cu grad de activitate moderat
- c) evolutie trenanta
- d) evolutie cronica cu grad de activitate sever
- e) evolutie cronica cu grad de activitate minim

325. Intrebarea nr. 325: I201 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati ce conjunctivita este caracteristica pentru infectia enterovirala:

- a) conjunctivita purulenta
- b) conjunctivita ulcero-necrotica
- c) conjunctivita hemoragica epidemica
- d) conjunctivita peliculara
- e) conjunctivita alergica

326. Intrebarea nr. 326: I202 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Agentul patogeni ai infectiei enterovirale este:

- a) virusul Epstein - Barr
- b) Virusurile ECHO si Coxsackie
- c) virusul HSV-8
- d) citomegalovirusul
- e) virusul Herpes Zoster

327. Intrebarea nr. 327: I203 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Sunt forme clinice ale infectiei enterovirale:

- a) herpangina
- b) angina eritematoasa
- c) mialgia epidemica (pleurodinie)
- d) enterocolita
- e) meningita seroasa

328. Intrebarea nr. 328: I204 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati formele clinice din infectia enterovirala

- a) hemoragica
- b) pleurodinia (mialgia epidemica)
- c) herpangina
- d) meningita seroasa
- e) encefalita epidemica

329. Intrebarea nr. 329: I205 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce modificari in LCR se intalnesc in meningita enterovirala

- a) numar de leucocite de gradul a sute - mii
- b) glicorahie mult scazuta
- c) predominarea limfocitelor asupra neutrofilelor
- d) proteinorahie usor crescuta
- e) eritrocite modificate

330. Intrebarea nr. 330: I206 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati modificarile din LCR caracteristice pentru meningita enterovirala

- a) depistarea agentului patogen prin coloratia Gram
- b) predominarea limfocitelor
- c) disociere celulo-proteica (citoza mai mare comparativ cu proteinorahia)
- d) citoza la nivel de 500 - 2000
- e) glicorahie mult scazuta

331. Intrebarea nr. 331: I532 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Formele clinice ale infectiei enterovirale cu afectarea SNC:

- a) meningita
- b) meningoencefalita
- c) cu sindrom oftalmoplegic
- d) cu sindrom rinofarinngoneurologic
- e) paralitica (polimielolitoformă)

332. Intrebarea nr. 332: I533 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Particularitatile clinice ale meningitei enterovirale

- a) sindromul hipertensiv pronuntat
- b) sindromul meningian inclomplet
- c) emne meningiene bine exprimate
- d) subfebrilitate
- e) semnele meningiene instabile

333. Intrebarea nr. 333: I534 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

In mialgia epidemică (mialgia epidemică) durerile violente sunt in muschii:

- a) toracici
- b) abdomenului
- c) gastro-cnemieni
- d) cervicali
- e) spinali

334. Intrebarea nr. 334: I535 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Conjunctivita hemoragica enterovirala se manifesta prin:

- a) fotofobie, lacrimatie
- b) edemul pleoapelor

- c) nistagm
- d) conjunctivita catarala
- e) hemoragii punctiforme conjunctivale

335. Intrebarea nr. 335: I578 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Sindromul „gura”, „mana”, „picior” este provocat de :

- a) virusul Epstein Barr
- b) virusul herpetic
- c) virusul varicelo- zosteridian
- d) Echo, Coxsackie
- e) HIV

336. Intrebarea nr. 336: I579 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Enterovirusii ECHO si Coxsacke sunt responsabili de sindroamele:

- a) herpangina
- b) meningita acuta limfocitară
- c) meningita purulentă
- d) pleurodinie
- e) pneumonie

337. Intrebarea nr. 337: I580 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Tratamentul etiologic in infectia enterovirala:

- a) nu este cunoscut
- b) cu acyclovir
- c) cu gancyclovir
- d) cu interferon
- e) cu ribaverina

338. Intrebarea nr. 338: I581 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Principala cauza a conjunctivitei hemoragice este virusul:

- a) enterovirusul
- b) virusul paragripal
- c) adenovirusul
- d) rinovirusul
- e) coronavirusul

339. Intrebarea nr. 339: I582 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Diagnosticul de laborator in infectia enterovirala

- a) izolarea virusului din secretul faringian
- b) izolarea virusului din materiile fecale
- c) aprecierea anticorpilor ant-ECHO, anti-Coxackie
- d) izolarea virusului din sange
- e) izolarea virusului din bila

340. Intrebarea nr. 340: I583 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Numiti sindroamele clinice ale infectiei enterovirale:

- a) pleurodinia
- b) Guillan- Barre
- c) paralytic
- d) gura-maina-picior
- e) toxiinfectios

341. Intrebarea nr. 341: I584 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc
Sindromul gura-maina-picior se caracterizeaza prin:

- a) febra 39-40⁰C
- b) febra moderata (subfebril)
- c) macule-papule pe tot corpul
- d) vezicule pe degetele mainilor si picioarelor
- e) vezicule pe mucoasa bucala.

342. Intrebarea nr. 342: I585 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc
Pleurodinia (mialgia epidemica,Boala Bornholm) este determinata de virusul :

- a) varicelo-zosterian
- b) citomegalic
- c) gripal
- d) enteroviral
- e) urlean

343. Intrebarea nr. 343: I586 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc
O particularitate a LCR ce sugereaza infectia enterovirala:

- a) pleocitoza depaseste 2 000 cl mm³
- b) pleocitoza neutrofila tranzitorie
- c) glucozarahia mult scazuta
- d) proteinorahia mult crescuta
- e) pleocitoza neutrofila in crestere

344. Intrebarea nr. 344: I587 **Capitol:** infectia enterovirala **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc
Sursa de infectie in infectia enterovirala este:

- a) omul bolnav
- b) rozatoarele
- c) purtatorii cronici
- d) ovinele
- e) pasarile

345. Intrebarea nr. 345: I207 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
In leptospiroza eruptiile specifice pot aparea in:

- a) 1 zi de boala
- b) 3-6 zi de boala
- c) 8-10 zi de boala
- d) 11-13 zi de boala
- e) 14-20 zi de boala

346. Intrebarea nr. 346: I208 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
Este caracteristic pentru leptospiroza:

- a) prurit cutanat
- b) hepatomegalie
- c) diaree profuza
- d) dureri abdominale incingatoare
- e) poliutie din primele zile de boala

347. Intrebarea nr. 347: I209 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati trasaturile caracteristice pentru leptospiroza

- a) hepatosplenomegalia
- b) instalarea insuficientei renale acute la cedarea febrei
- c) afectarea cailor respiratorii superioare
- d) hemoragii gastrointestinale in formele avansate de boala
- e) limfomonocitoza pronuntata, cu prezenta limfocitelor atipice

348. Intrebarea nr. 348: I210 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati manifestarile caracteristice pentru leptospiroza

- a) sindrom hemoragic pronuntat in debutul bolii
- b) pneumonia interstitiala rapid evolutiva
- c) insuficienta renala cu instalarea perioadelor de oligurie, anurie, poliurie
- d) mialgii pronuntate ale muschilor gastrocnemieni
- e) leucocitoza cu neutrofiloza si deviere spre stanga

349. Intrebarea nr. 349: I211 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati manifestarile caracteristice pentru leptospiroza

- a) nivel crescut al creatininei si ureei sangvine
- b) majorarea AlAt de mai mult de 20 ori
- c) micșorarea indicelui protrombinic pana la 40-50%
- d) bilirubinemie preponderent pe contul fractiei conjugate
- e) proteinurie, cilindurie si eritrociturie

350. Intrebarea nr. 350: I212 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati tactica corecta de tratament in leptospiroza

- a) administrarea de glucocorticosteroizi in doze mari
- b) administrarea de sulfanilamide
- c) tratamentul etiotrop cu penicillini
- d) terapia de dezintoxicare
- e) hemodializa in cazurile grave

351. Intrebarea nr. 351: I213 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati afirmatiile corecte referitoare la leptospiroza:

- a) este o antroponoza
- b) debut acut cu febra 38-39
- c) normalizarea temperaturii este intotdeauna un indice al insanatosirii
- d) cauza principala de deces este insuficienta renala cu sindrom hemoragic
- e) nivelul transaminazelor este moderat crescuta

352. Intrebarea nr. 352: I214 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru leptospiroza sunt caracteristice urmatoarele semne clinice:

- a) febra pe parcursul a 3 saptamani
- b) sindrom hemoragic
- c) oligo-anurie
- d) hepatosplenomegalie
- e) angina ulcero-necrotica

353. Intrebarea nr. 353: 304 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Etapelile patogenetice ale leptospirozei

- a) incubatia
- b) leptospiremia si toxemia
- c) patrunderea în organe
- d) stadiul de schimbari postleptospirice
- e) ciroza hepatica postleptospirozică

354. Intrebarea nr. 354: I472 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Afectarea sistemelor în leptospiroza

- a) respirator
- b) gastrointestinal
- c) urinar
- d) cardiovascular
- e) hepatic

355. Intrebarea nr. 355: I473 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Pentru leptospiroză este caracteristică:

- a) anemia pernicioasă
- b) anemia hemolitică
- c) anemia postprandială
- d) anemie progresivă posthemoragică
- e) leucopenia cu neutrofilie și VSH crescut

356. Intrebarea nr. 356: I474 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Schimbări în analiza generală a sîngelui în leptospiroza:

- a) Eritrocitoza
- b) VSH crescut
- c) Leucopenia, limfocitoza
- d) Hipereozinofilia moderată
- e) Leucocitoza cu neutrofilie

357. Intrebarea nr. 357: I475 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Sursa de infectie în leptospiroza sunt

- a) șobolanii
- b) păsările
- c) aricii
- d) câinii
- e) nutriile

358. Intrebarea nr. 358: I476 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Semnele clinice incipiente caracteristice leptospirozei sunt

- a) conjunctivita, hemoragii congențivale
- b) febra 38- 39 °
- c) sindrom meningian

d) sindrom nefrotic

e) dureri musculare gastrocnemiene

359. Intrebarea nr. 359: I477 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Evolutiile caracteristice leptospirozei

a) cu insanatosire

b) cu sechele din partea ficatului si rinichilor

c) cu evolutie in meningoencefalita

d) cu sfarsit letal

e) insuficienta renala cu oligo- si anurie

360. Intrebarea nr. 360: I478 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Diagnosticul diferential al leptospirozei

a) tifosul exantimatic

b) febrele hemoragice cu sindrom renal

c) gripa

d) pneumonia

e) scaderea acuitatii vederii

361. Intrebarea nr. 361: I479 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Afirmatie incorectă pentru leptospiroza

a) debutul acut cu febra 38- 39⁰

b) cauza icterului este afectarea ficatului si hemoliza sangelui

c) in perioada de stare are loc leucopenia

d) dupa structura antigenica se deosebesc 22 serogrupuri si aproape 200 serotipuri

e) leptospiroza este o zoonoză

362. Intrebarea nr. 362: I480 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Agentul patogen al leptospirozei umane este

a) *Rickettsia Rickettsi biflexa*

b) *Lambliia intestinalis*

c) *Chlamidia intestinalis*

d) *Leptospira interrogans*

e) *Leptospira*

363. Intrebarea nr. 363: I481 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Sindrom necaracteristic leptospirozei

a) sindrom gripal

b) sindrom hemoragic

c) hepatosplenomegalia

d) sindrom meningian

e) oculobubonic

364. Intrebarea nr. 364: I482 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Afectarea caror organe si sisteme are loc in leptospiroza

a) ficatul si splina

- b) meningele
- c) muschii gastrocnemieni
- d) amigdalele
- e) tractul gastrointestinal

365. Intrebarea nr. 365: I483 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
 Fazele patogenetice grave in leptospiroza

- a) faza de patrundere, inmultire si infestari primară cu intoxicatie
- b) faza de stare cu afectarea organelor interne
- c) convalescenta cu restabilirea schimbarilor organelor restante
- d) complicatii legate cu afectarea ochilor si rinichilor
- e) afectarea organelor genitale

366. Intrebarea nr. 366: I484 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
 Complicatiile aparute in leptospiroza

- a) conjunctivita
- b) irita, uveita, sclereita
- c) iridociclita, opacitatea corpului vitros
- d) infectii asociate (pneumonii, otite, stomatite, anemia)
- e) abcedarea articulatiilor

367. Intrebarea nr. 367: I485 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
 Caracteristic leptospirelor

- a) Rezistente in mediu inconjurator (apa 2-3 saptamini, in sol - la 3 luni)
- b) Pe produse alimentare se pastreaza citeva zile
- c) Rezistente la iradiere ultra violeta, caldura , dezinfectante
- d) Se distrug in organismul omului
- e) Se distrug in organismul rozatoarelor

368. Intrebarea nr. 368: I486 **Capitol:** leptospiroza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
 Diagnosticul diferential al meningitei leptospirotice

- a) meningita enterovirala
- b) meningita tuberculozica
- c) meningita meningococica
- d) meningita pneumococica
- e) meningita urliană

369. Intrebarea nr. 369: I215 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
 Metoda rapida pentru confirmarea meningitei meningococice este :

- a) bacterioscopica
- b) bacteriologica
- c) biologica
- d) serologica
- e) alergica

370. Intrebarea nr. 370: I216 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
 Pentru meningita meningococica in LCR este caracteristica pleocitoza :

- a) imfocitara, 10 000 in mcl
- b) limfocitara, 500 in mcl
- c) limfocitara, 1000 in mcl
- d) mixta (70% limfocite, 30% neutrofile), 200 in mcl
- e) neutrofilica, 10 000 in mcl

371. Intrebarea nr. 371: I217 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Mediul selectiv pentru cultivarea meningococului este :

- a) bulion peptonat
- b) bulion-ser
- c) bulion de bila
- d) mediu de culturi celulare vii
- e) agar cu galbenus

372. Intrebarea nr. 372: I218 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Meningita meningococica este :

- a) seroasa primara
- b) seroasa secundara
- c) purulenta primara
- d) purulenta secundara
- e) cu pleiocitoza mixta

373. Intrebarea nr. 373: I219 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Metoda de baza pentru confirmarea diagnosticului de meningita :

- a) ultrasonografia
- b) EEG
- c) tomografia computerizata
- d) radiografia
- e) punctia lombara

374. Intrebarea nr. 374: I220 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Meningita seroasa este provocata de :

- a) Neiseria
- b) Stafilococ
- c) Pneumococ
- d) Mycobacterium tuberculosis
- e) Haemophilus influenzae

375. Intrebarea nr. 375: I221 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Meningita cu LCR hemoragic este :

- a) meningococica
- b) in antrax
- c) enterovirala
- d) pneumococica
- e) tuberculoasa

376. Intrebarea nr. 376: I222 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

In ce cazuri este contraindicata punctia lombara:

- a) in stare de soc
- b) la nou-nascuti
- c) la varstnici
- d) in edem cerebral
- e) la suspectarea unui proces de volum a SNC

377. Intrebarea nr. 377: I223 Capitol: meningita Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Modificarile LCR, caracteristice meningitelor purulente :

- a) LCR opalescent
- b) micșorarea moderata a glucozei din LCR
- c) mii de leucocite / mm³, majoritatea polimorfonucleare
- d) cateva sute / mm³, majoritatea mononucleare (limfocite)
- e) proteinorahia importanta (peste 1,0%)

378. Intrebarea nr. 378: I224 Capitol: meningita Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Indicati afirmatiile corecte referitoare la meningite:

- a) cele mai frecvente meningite virale sunt produse de enterovirusuri
- b) cele mai frecvente meningite bacteriene sunt produse de meningococc, pneumococc si haemophilus influenzae
- c) meningitele in majoritatea cazurilor evolueaza in epidemii extinse
- d) germenii supravietuiesc in spatiul subarahnoidian datorita nivelului scazut de complement, imunoglobuline si opsonizarii scazute a leucocitelor
- e) sindromul encefalic este intotdeauna prezent in meningitele seroase

379. Intrebarea nr. 379: I225 Capitol: meningita Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Meningita se confirma prin semnele :

- a) Pastia
- b) Kerning
- c) Padalca
- d) redoarea de ceafa
- e) Brudzinski

380. Intrebarea nr. 380: I226 Capitol: meningita Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Manifestarile clinice in meningococemie sunt :

- a) febra remitenta din prima zi
- b) eruptii rozeolice din a 5 zi
- c) eruptii hemoragice din prima zi
- d) semne meningiene pozitive
- e) sindrom de intoxicatie

381. Intrebarea nr. 381: I227 Capitol: meningita Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Formele rare ale infectiei meningococice sunt :

- a) hepatita
- b) artrita

- c) endocardita
- d) rino faringoconjunctivita
- e) iridociclita

382. Intrebarea nr. 382: I228 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru confirmarea meningitei meningococice se pot utiliza metodele :

- a) biologice
- b) bacterioscopice
- c) bacteriologice
- d) alergice
- e) serologice

383. Intrebarea nr. 383: I229 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru meningita meningococica sunt caracteristice :

- a) febra remitenta
- b) voma tip central
- c) eruptii hemoragice
- d) semne meningiene pozitive
- e) nazofaringita

384. Intrebarea nr. 384: I230 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Formele caracteristice pentru infectia meningococica sunt :

- a) imfadenopatica
- b) septicemica
- c) nazofaringita
- d) meningita
- e) conjunctivita

385. Intrebarea nr. 385: I231 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Semnele caracteristice pentru meningita meningococica sunt :

- a) febra remitenta
- b) cefalea difuza violenta
- c) debut subacut
- d) LCR cu pleocitoza neutrofilica
- e) paralizie / pareza de nervi cranieni din primele zile de boala

386. Intrebarea nr. 386: I232 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Semnele clinice ale formei fulminante de meningococemie (sindromul Waterhouse-Friderichen) sunt :

- a) debut violent
- b) icter progresiv
- c) encefalomielita
- d) hipotensiune
- e) hemoragii extinse

387. Intrebarea nr. 387: I551 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Meningitele primare sunt de etiologie

- a) enterovirala
- b) meningococica
- c) chloriomeningita limfocitara
- d) streptococita
- e) stafilococica

388. Intrebarea nr. 388: I552 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

LCR hipertensiv clar se poate constata in meningitele:

- a) stafilococica
- b) enterovirala
- c) urleana
- d) leptospirozica
- e) Neiseria meningitidis

389. Intrebarea nr. 389: I553 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

LCR in meningita carbunoasa are caracter:

- a) seros
- b) purulent
- c) hemoragic
- d) pleocitoza neutrofilica
- e) proteinorahia mult crescuta

390. Intrebarea nr. 390: I554 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Datele clinice in meningita meningococica:

- a) febra 38-39⁰
- b) semnele meningiene pronuntate
- c) eruptii hemoragice
- d) hiperestezia, hiperacuzia
- e) dureri musculare

391. Intrebarea nr. 391: I555 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Pentru meningita meningococica nu pledeaza:

- a) premorbidul (pneumonie, sinusite, otite)
- b) debutul acut cu 39-40⁰
- c) vome frecvente
- d) pleocitoza neutrofila
- e) semne meningiene pozitive

392. Intrebarea nr. 392: I556 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Alegeti metodele specifice pentru confirmarea diagnosticului de infectie meningococica:

- a) biologica
- b) bacterioscopia picaturii groase
- c) bacterioscopia LCR
- d) bacteriologia LCR
- e) urocultura

393. Intrebarea nr. 393: I557 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Semnul de prognostic nefavorabil in meningococcemie:

- a) extinderea eruptiilor hemoragice pe trunchi, membre superioare, fata

- b) artrita meningococică
- c) pneumonie meningococică
- d) febra 39-40⁰
- e) iridociclita meningococică

394. Intrebarea nr. 394: I558 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Meningita meningococică poate fi confirmată prin

- a) pleocitoza neutrofila mai mult de 12 000 cel/mm³
- b) pleocitoza limfocitară
- c) pleocitoza mixtă (30% neutrofile, 70% limfocite)
- d) depistarea diplococilor gram-negativi în LCR
- e) licvorocultura pozitivă cu Neiseria meningitidis

395. Intrebarea nr. 395: I559 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Cauzele cele mai frecvente ale deceselor în infecția meningococică sunt:

- a) meningita purulentă prealabil tratată
- b) meningita cu ependimatită
- c) edem cerebral acut
- d) socul toxicoinfectios
- e) pneumonia meningococică

396. Intrebarea nr. 396: I560 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Sechele grave după meningita meningococică pot fi:

- a) piocefalie
- b) hidrocefalie
- c) pareze ale nervilor cranieni
- d) paralezia flasca
- e) insuficiența cardiovasculară

397. Intrebarea nr. 397: I561 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Numite formele rare ale infecției meningococice

- a) endocardita meningococică
- b) limfadenita meningococică
- c) artrita meningococică
- d) iridociclita meningococică
- e) rino-faringita meningococică

398. Intrebarea nr. 398: I562 **Capitol:** meningita **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** semeniuc

Erupțiile în meningococcemie se caracterizează prin:

- a) apar în 1-2 zi de boală
- b) apar la 3-4 zi de boală
- c) hemoragice de la petesii la echimoze
- d) hemoragice cu necroze
- e) erupția preferă fata

399. Intrebarea nr. 399: I233 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scăzut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Semnul clinic cel mai caracteristic pentru mononucleoza infecțioasă :

- a) edemul palpebral
- b) limfadenopatia cervicală
- c) insuficiența renală

- d) erupția rubeoliformă
- e) hematuria

400. Întrebarea nr. 400: I234 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scăzut
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** n

Unul din semnele cardinale ale mononucleozei infectioase este :

- a) angina
- b) artrita
- c) encefalita
- d) nefrita
- e) orhita

401. Întrebarea nr. 401: I235 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** n

Sindromul mononucleozic poate fi întâlnit în:

- a) Infecția cu EBV
- b) Infecția cu CMV
- c) balantidiaza
- d) infecția cu HIV
- e) socul toxiinfecțios

402. Întrebarea nr. 402: I236 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** n

Identificați afirmațiile corecte din mononucleoza infectioasă :

- a) leucoplachia paroașă a limbii apare în majoritatea cazurilor
- b) tabloul hematologic evidențiază o leucocitoză cu neutropenie relativă
- c) hepatita mononucleozică are un procent ridicat de cronicizare
- d) angina apare în 80% din cazuri
- e) tabloul hematologic evidențiază limfocite atipice

403. Întrebarea nr. 403: I237 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** n

Tratamentul mononucleozei infectioase severe include :

- a) repaos la pat
- b) spasmolitice
- c) igiena riguroasă a cavității bucale
- d) corticosteroizi în cazurile severe
- e) administrarea de ser specific

404. Întrebarea nr. 404: I238 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** n

Caracterizați ganglionii limfatici din mononucleoza infectioasă :

- a) se măresc cu precădere cei supraclaviculari și axilari
- b) nu supurează
- c) este cu precădere o limfadenopatie unilaterală
- d) sunt puțin sensibili la palpare
- e) nu aderează între ei

405. Întrebarea nr. 405: I239 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** n

În mononucleoza infectioasă se poate remarca:

- a) hiperbilirubinemia pe contul fracției conjugate
- b) hipertransaminazemia
- c) hipergamaglobulinemia

d) hiperbilirubinemia pe contul fractiei libere

e) hiperaldolazemia

406. Intrebarea nr. 406: I536 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru mononucleoza infectioasa este caracteristica afectarea sistemului

a) reticuloendotelial

b) cardiovascular

c) sistemul nervos central

d) urogenital

e) tegumentar

407. Intrebarea nr. 407: I537 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Amigdalitele in mononucleoza infectioasa pot fi:

a) pseudomembranara

b) lacunara

c) foliculara

d) hemoragica

e) angina bubonica

408. Intrebarea nr. 408: I538 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In mononucleoza infectioasa se inregistreaza

a) leucopenie, neutropenie

b) leucopenie limfocitara

c) limfomonocitoza

d) leucocitoza, limfocitoza

e) leucocitoza cu neutropenie

409. Intrebarea nr. 409: I539 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Anticorprii specifici in mononucleoza infectioasa sunt:

a) Anticorprii IgM față de antigenul capsidic (IgM - VCA)

b) Anticorprii IgG față de antigenul capsidic (IgG - VCA)

c) antinucleari

d) anticorpi heterofili

e) antimembranari

410. Intrebarea nr. 410: I540 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatiile incorecte in mononucleoza infectioasa

a) o complicatie frecventa este anemia aplastica

b) incubatia este de 2- 3 zile

c) hepatita mononucleozica este frecventa

d) angina apare in 80% din cazuri

e) In hemoleucograma limfomonocitoză cu limfocite atipice

411. Intrebarea nr. 411: I541 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Numiti infectiile cu poliadenopatie generalizata frecventa

a) Infectia meningococica

- b) Mononucleoza infectioasa
- c) toxoplasmoza
- d) infectia HIV
- e) herpes Zoster

412. Intrebarea nr. 412: I542 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In mononucleoza apar primii anticorpii:

- a) Anticorpii IgM față de antigenul capsidic (IgM - VCA)
- b) Antinucleari
- c) Anticorpi heterofili
- d) Anticorpi fata de antigenul precoce
- e) Anti HBcor IgM

413. Intrebarea nr. 413: I543 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru mononucleoza infectioasa este caracteristică hipertrofia ganglionilor limfatici:

- a) cervicali anteriori
- b) cervicali posteriori
- c) occipitali
- d) mezenteriali
- e) paratrahiali

414. Intrebarea nr. 414: I544 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Sindromul mononucleozic poate fi constatat in infectiile :

- a) HIV
- b) Toxoplasmoza
- c) Enterovirala
- d) Citomegalica
- e) Herpetica

415. Intrebarea nr. 415: I545 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In tratamentul mononucleozei infectioase este contraindicat:

- a) cefatoxima
- b) ceftriaxona
- c) ampicilina
- d) paracetamolul
- e) suprastina

416. Intrebarea nr. 416: I546 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Formele generalizate ale infectiei meningococice sunt:

- a) nazofaringita
- b) meningita
- c) meningococemia
- d) meningoencefalita
- e) artrita meningococica

417. Intrebarea nr. 417: I547 **Capitol:** mononucleoza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Pentru febra tifoida sunt caracteristice

- a) agitatie
- b) fata hiperemiata
- c) tegumentele palide
- d) adinamia, astenia
- e) obnubilare

418. Intrebarea nr. 418: I548 Capitol: mononucleoza Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Meningococemia se poate confirma prin:

- a) bacterioscopia picaturii groase
- b) bacterioscopia din elementul eruptiv
- c) insamantarea a 5ml sange in 50 ml de bulion-ser
- d) insamantarea 5 ml sange in 50 ml bulion de zahar
- e) insamantarea 10 ml sange in 100 ml bulion de bila

419. Intrebarea nr. 419: I549 Capitol: mononucleoza Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

In mononucleoza infectioasa evedintierea anticorpilor heterofil se face prin teste :

- a) Dick
- b) Paul- Bunel
- c) Monospot
- d) Widal
- e) Hoff Bauer

420. Intrebarea nr. 420: I550 Capitol: mononucleoza Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Sindromul meningian in infectia meningococica se exprima prin:

- a) pozitia bolnavului in „cocos de pusca”
- b) semnul Kernig
- c) Brudzinski superior
- d) Semnul Govorov
- e) Semnul Padalc

421. Intrebarea nr. 421: I240 Capitol: pesta Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Forma clinica a pestei este :

- a) icterica
- b) bubonica
- c) hepatica
- d) cerebrala
- e) oculo-bubonica

422. Intrebarea nr. 422: I241 Capitol: pesta Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu

Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: n

Indicati afirmatiile corecte din pesta :

- a) bubonul in pesta este indolor
- b) in forma pulmonara moartea survine in 3-5 zi din cauza insuficientei circulatorii
- c) buboanele sunt mai frecvent multiple, ca exceptie - solitare
- d) ulcerele se disting prin sensibilitate vadita la durere

e) forma pulmonara secundara este similara cu cea primara

423. Intrebarea nr. 423: I242 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Formele clinice ale pestei sunt :

- a) nefrotica
- b) cutanata
- c) pulmonara primara
- d) pulmonara secundara
- e) icterica

424. Intrebarea nr. 424: I243 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In pesta in hemograma se remarca urmatoarele modificari:

- a) leucocitoza pronuntata
- b) deviere spre stanga a formulei leucocitare
- c) trombocitopenie moderata
- d) leucopenie
- e) limfomonocitoza >75-80%

425. Intrebarea nr. 425: I425 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Incubatia in pesta

- a) 1-2 zile
- b) 3- 6 zile
- c) 7-10 zile
- d) 11-15 zile
- e) 16- 20 zile

426. Intrebarea nr. 426: 2 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10
Timp pe intrebare: 0 sec **Autor:** botezatu

Pentru diagnosticul de laborator al pestei sunt colectate

- a) sputa, frotiu din faringe
- b) punctatul ganglionar
- c) secretul lacrimar
- d) secretul vaginal
- e) singele

427. Intrebarea nr. 427: I427 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Pentru diagnosticul de laborator al pestei se folosesc metode

- a) bacteriologica
- b) bacterioscopica
- c) proba intracutana
- d) Western-blot
- e) PCR

428. Intrebarea nr. 428: I428 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Pentru analize de laborator in pesta se folosesc metode

- a) intracutana
- b) biologica
- c) serologica
- d) bacterioscopica

e) Western-blot

429. Intrebarea nr. 429: I429 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Reactiile serologice folosite pentru diagnosticul pestei

a) Western-blot

b) Reactia de hemaglutinare pasiva

c) Reactia de neutralizare a anticorpilor

d) Reactia de neutralizare a antigenelor

e) Rinocitoscopia

430. Intrebarea nr. 430: I430 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Intra in componenta costumului antipestic

a) halat special

b) halat cu mineci scurte

c) boneta

d) ochelari

e) masca speciala

431. Intrebarea nr. 431: I431 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Tratamentul etiotrop al pestei

a) durata tratamentului 7-10 zile

b) durata tratamentului 5-6 zile

c) streptomicina cu dehidroestreptomicina

d) streptomicina

e) streptomicina cu tetraciclina

432. Intrebarea nr. 432: I432 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Tratamentul specific al pestei

a) etiotrop

b) patogenetic

c) simptomatic

d) desensibilizant

e) rehidratant

433. Intrebarea nr. 433: I433 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Caile de patrundere a bacilului pestos in organism

a) pielea, conjunctiva

b) mucoasa cavitatii bucale

c) caile respiratorii, rinofaringe

d) caile sexuale

e) transmisibil

434. Intrebarea nr. 434: I434 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Caile de molipsire cu yersinia pestis :

a) de contact

b) cu ajutorul muștelor

- c) respirator
- d) transmisibil
- e) sexual

435. Intrebarea nr. 435: I435 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Iersinia pestis este sensibila la

- a) temperaturi inalte
- b) la lumina
- c) la temperaturi joase
- d) la dezinfectante
- e) la desensibilizante

436. Intrebarea nr. 436: I436 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

La om cel mai frecvent provoaca maladia iersiniile patogene

- a) iersinia enterocolitica
- b) iersinia maretobica
- c) iersinia pseudotuberculozica
- d) iersinia murina
- e) iersinia pestei

437. Intrebarea nr. 437: I437 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Formele clinice mai frecvente in pesta

- a) hepatica
- b) cutanata
- c) bubonica
- d) pneumonica
- e) articulara

438. Intrebarea nr. 438: I438 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Caracterul scaunului în pesta

- a) ichid cu mucus
- b) lichid apos fara urme de sînge
- c) lichid cu mucus si sînge
- d) lichid cu mucus sticlos
- e) lichid sub forma de jem de zmeura

439. Intrebarea nr. 439: I439 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Inmultirea bacilului pestos la purice are loc in

- a) intestin subtire
- b) intestin gros
- c) in prestomac si stomac
- d) in cavitatea bucala
- e) in glande salivare

440. Intrebarea nr. 440: I440 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Agentul patogen ce provoaca ciurma

- a) Escherihia coli
- b) Clostridium antrax
- c) Clostridium tetanus
- d) Balantidium coli
- e) Iersinia pestis

441. Intrebarea nr. 441: I441 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Vectorul principal de transmitere a pestei

- a) tantari
- b) taunii
- c) puricii
- d) paduchii
- e) flebotom

442. Intrebarea nr. 442: I442 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Cura de tratament in pesta dureaza

- a) 6 zile
- b) 7-10 zile
- c) 10-14 zile
- d) 15-20 zile
- e) 21- 30 zile

443. Intrebarea nr. 443: I443 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Diagnosticul diferential al pestei se face cu

- a) HIVinfectie
- b) meningita
- c) tularemie
- d) mononucleoza infectioasa
- e) limforeticuloza benigna

444. Intrebarea nr. 444: I444 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Perioadele clinice a pestei

- a) incipienta
- b) de stare

- c) terminala
- d) latentă
- e) recidivanta

445. Intrebarea nr. 445: I445 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Căile de infectare cu yersinia pestis:

- a) hidrica
- b) sexuala
- c) de contact
- d) alimentara
- e) transmisiva

446. Intrebarea nr. 446: I446 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Formele localizate ale peștei

- a) a mucoaselor
- b) a mucoasei și bubonica
- c) cutanată
- d) bubonica
- e) cutano- bubonica

447. Intrebarea nr. 447: I447 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Intoxicatia în pesta se manifesta prin

- a) dereglari de coordonare
- b) excitare
- c) inhibare

- d) halucinatii
- e) trism

448. Intrebarea nr. 448: I448 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10

Timp pe intrebare: 0 sec **Autor:** botezatu

Localizarea cea mai frecventă a bubonilor in pesta:

- a) occipitală
- b) inghinală
- c) cervicală
- d) subaxilară
- e) submandibulară

449. Intrebarea nr. 449: I449 **Capitol:** pesta **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Forme de evolutie a buboanelor in pesta

- a) drenare
- b) sclerozare
- c) resorbție
- d) abcedare
- e) recidivare

450. Intrebarea nr. 450: I244 **Capitol:** pseudotuberculoza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Semnele caracteristice pentru pseudotuberculoza sunt :

- a) febra 38-39
- b) disfagie
- c) eruptii polimorfe
- d) hepatomegalie
- e) sindrom hemoliticouremic

451. Intrebarea nr. 451: I245 **Capitol:** rabia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In tabloul clinic al rabiei distingem stadiile :

- a) de excitare
- b) de convalescenta
- c) prodromala
- d) paralitica
- e) icterica

452. Intrebarea nr. 452: I246 **Capitol:** rabia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
 Pentru rabie sunt corecte urmatoarele afirmatii:

- a) este o encefalo-mielita cu evolutie rapida si invariabil duce la decese
- b) primele simptome pot aparea intr-un interval cuprins intre citeva zile si aproape un an
- c) o importanta decisiva o are confirmarea diagnosticului prin teste specifice de laborator
- d) se caracterizeaza prin manifestarea unor stari de hidrofobie, aerofobie, agitatiie extrema, furie, hiperacuzie, halucinatii, dificultati de respiratie
- e) cel mai eficient mod de prevenire a turbarii este vaccinarea anuala antirabica

453. Intrebarea nr. 453: I247 **Capitol:** rabia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
 Rabia se manifesta prin:

- a) perioade alternante de comportament normal si comportament bizar sau neobisnuit (anxietate, halucinatii, delir)
- b) soc toxic
- c) frica de apa (hidrofobie) sau frica de aer (aerofobie)
- d) spasme musculare la nivelul muschilor fetei, gatului sau diafragmului, urmate de convulsii
- e) semen avansate de deshidratare

454. Intrebarea nr. 454: I248 **Capitol:** rabia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
 Cele mai eficiente metode de prevenire a rabiei sunt:

- a) dupa o expunere posibila la virusul rabic, se impune curatirea ranii imediat cu multa apa si sapun pentru a reduce riscul infectiei
- b) izolarea si supravegherea animalului suspect de turbare timp de 1 luna
- c) este indicata efectuarea unui consult medical de specialitate pentru a se stabili un tratament profilactic complex
- d) tratament profilactic cu vaccin si cu gamaglobulina antirabica conform schemei
- e) exista tratament specific pentru persoanele la care au aparut simptome de infectie cu rabie

455. Intrebarea nr. 455: I600 **Capitol:** rabia **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting rascov
 Pentru debutul bolii in rabie cel mai caracteristic semn este:

- a) cefalea
- b) senzatia de parestezie la locul de inoculare a virusului
- c) agitatiia psihomotorie
- d) febra
- e) anorexia

456. Intrebarea nr. 456: I601 **Capitol:** rabia **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting rascov

In cazul salivarii dermei sau mucoaselor deteriorate de orice localizare de către un animal bolnav de rabie, tratamentul cu vacin si imunoglobulina antirabica:

- a) nu se indica
- b) se incepe odată cu aparitia semnelor clinice de boala
- c) se incepe odata cu disparitia animalului bolnav
- d) se incepe cu administrarea imediata a cate 1ml vaccin în conformitate cu schema: la zilele 0, 3, 7, 14, 30, 90
- e) se incepe imediat cu imunoglobulina antirabica la ziua 0 + vacin cate 1 ml la zilele 1, 3, 7, 14, 30, 90

457. Intrebarea nr. 457: I602 **Capitol:** rabia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10
Timp pe intrebare: 0 sec **Autor:** poting rascov
 Pentru rabie sunt corecte urmatoarele afirmatii:

- a) morbiditatea in rabie predomina in perioada vara-toamna
- b) cazurile de rabie in tarile dezvoltate sunt frecvente
- c) perioada de incubatie in rabie are variatii extreme de la 8 zile pana la 2 ani
- d) virusul rabic nu se contine in saliva, lacrimile si lichidul cefalo-rahidian ale bolnavului
- e) omul este un impas biologic si nu prezinta pericol ca sursa de infectie

458. Intrebarea nr. 458: I603 **Capitol:** rabia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting rascov

Schema imunizarii curative-profilactice cu vaccin si imunoglobulina antirabica se initiaza in dependenta de:

- a) varsta pacientului
- b) caracterul contactului
- c) starea animalului la momentul muscaturii
- d) zona geografica unde a luat loc incidentul
- e) datele despre animal dupa 10 zile de supraveghere

459. Intrebarea nr. 459: I604 **Capitol:** rabia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting rascov

Contraindicatii catre administrarea profilactica a vaccinului si imunoglobulinei antirabice sunt:

- a) boli infectioase acute
- b) perioada de timp de pste 5 zile de la momentul muscaturii
- c) reactii alergice sistemice, cum ar fi edemul Quinke
- d) varsta
- e) sarcina

460. Intrebarea nr. 460: I249 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Cel mai frecvent inregistrata forma de salmoneloza este :

- a) starea de purtator
- b) gastrointestinala
- c) tifoida
- d) septicopiemica
- e) recidivanta

461. Intrebarea nr. 461: I250 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
Scaune apoase, verzui, fetide, nesangvinolente sunt caracteristice in urmatoarea forma clinica a salmonelozei :

- a) gastritica
- b) gastroenteritica
- c) gastroenterocolitica
- d) enterocolitica
- e) tifoida

462. Intrebarea nr. 462: I251 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
Socul hipovolemic se poate dezvolta in urmatoarea forma clinica a salmonelozei :

- a) tifica
- b) gastroenteritica
- c) colitica
- d) gastritica
- e) septica

463. Intrebarea nr. 463: I252 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
Febra cu o durata de 4 saptamani se intalneste in urmatoarele forme de salmoneloza :

- a) gastrica
- b) gastroenteritica
- c) tifoida
- d) gastroenterocolitica
- e) enterocolitica

464. Intrebarea nr. 464: I253 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
Pentru forma gastro-intestinala a salmonelozei metoda principala de tratament este :

- a) terapia cu glucocorticosteroizi
- b) terapia patogenetica
- c) terapia antimotilica
- d) terapia desensibilizanta
- e) antiparazitara

465. Intrebarea nr. 465: I254 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10
Timp pe intrebare: 0 sec **Autor:** n
Variantele clinice in forma intestinala a salmonelozei sunt :

- a) gastroenteritica
- b) colitica
- c) septicemica
- d) gastrica
- e) gastroenterocolitica

466. Intrebarea nr. 466: I255 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
Starile de eliminare bacilara in salmoneloza pot fi :

- a) acuta

- b) cronică
- c) tranzitorie
- d) postinfecțioasă
- e) convalescentă

467. Întrebarea nr. 467: I256 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** n

Enumerati afirmatiile corecte referitoare la salmoneloza:

- a) rezervorul principal al infecției este, în cea mai mare parte, extrauman
- b) forma generalizată a salmonelozei poate realiza două variante evolutive
- c) pentru tratamentul formelor generalizate ne putem limita la Sol. poliionice perorale
- d) un semn permanent în formele localizate este durerea abdominală
- e) un semn permanent în formele tipice de salmoneloza sunt tenezmele și chemarile false

468. Întrebarea nr. 468: I257 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** n

Forma gastrointestinală a salmonelozei are următoarele variante :

- a) gastrică
- b) gastroenterică
- c) gastroenterocolitică
- d) colitică
- e) rectosigmoidiană

469. Întrebarea nr. 469: I258 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** n

Despre starea tranzitorie de purtător în salmoneloza se poate vorbi în cazul când se întrunesc criteriile :

- a) suportarea salmonelozei acute 1-2 luni în urmă
- b) lipsa semnelor clinice de salmoneloza în decursul a 3 luni precedente
- c) una sau două emisii bacilare urmate de triplu rezultat negativ al examenului bacteriologic al maselor fecale și urinei
- d) rezultate pozitive pentru testele serologice
- e) rezultate negative pentru testele serologice

470. Întrebarea nr. 470: I259 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** n

Analiza generală a sângelui în salmoneloza se caracterizează prin :

- a) scăderea nivelului de eritrocite și Hb
- b) limfomonocitoză
- c) leucocitoză
- d) deviere spre stânga a formulei leucocitare
- e) neutrofiloză

471. Întrebarea nr. 471: I305 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scăzut **Punctajul:** 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

În ultimii ani tot mai evidentă este creșterea îmbolnăvirii prin Salmonela:

- a) *S. typhimurium*
- b) *S. enteritidis*
- c) *S. panama*
- d) *S. infantis*
- e) *S. Newport*

472. Întrebarea nr. 472: I306 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scăzut **Punctajul:** 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

S. enteritidis se transmite preponderent prin intermediul:

- a) apei
- b) contactului direct
- c) contactului indirect
- d) cărnii de pasăre și a ouălor
- e) aerosolului

473. Intrebarea nr. 473: I307 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Perioada de incubare in salmoneloza la infectarea pe cale alimentară este de :

- a) 1-3 ore
- b) 3 - 6 ore
- c) 6 ore - 3 zile
- d) 1 - 7 zile
- e) pina la 182 zile

474. Intrebarea nr. 474: I308 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

În cazul unei salmoneloze nozocomiale, unde cale de transmitere este reponderent menajeră, perioada de incubare ajunge la:

- a) 12 ore
- b) 1 - 2 zile
- c) 3-8 zile
- d) 1 - 2 săptămâni
- e) 3 - 4 săptămâni

475. Intrebarea nr. 475: I309 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Apariția formelor tifice, septice, subclinice și cronice în salmoneloză se eplică prin:

- a) apariția toleranței imunologice față de antigenul salmonelotice
- b) infectarea cu *S. typhimurium*
- c) mimicriei antigenice salmonelotice
- d) în rezultatul scăderii temporare a activității funcționale a fagociților
- e) o doză infectantă de agenți salmonelotici de peste 100 per gram de aliment

476. Intrebarea nr. 476: I310 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Pentru varianta tifoidă a formei generalizate a salmonelozei sunt caracteristice:

- a) insuficiența renală
- b) peste 1-2 zile de la debut dereglările intestinale iau sfârșit
- c) semnele de impregnare infecțioasă sunt în creștere
- d) către sfârșitul primei săptămîni de boală apare hepatosplenomegalia
- e) șocul hipovolemic

477. Intrebarea nr. 477: I311 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Pentru varianta tifoidă a formei generalizate a salmonelozei sunt caracteristice:

- a) insuficiența renală
- b) peste 4-5 zile de la debut dereglările intestinale continuă
- c) semnele de impregnare infecțioasă sunt în creștere
- d) Către sfârșitul primei săptămîni de boală apare hepatosplenomegalia

e) Din ziua a 6-a, a 7-a apare exantem rozeolos, preponderent pe abdomen.

478. Intrebarea nr. 478: I312 **Capitol:** salmoneloza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Pentru varianta septică forma generalizata a salmonellozei sunt caracteristice:

- a) evoluția cea mai gravă
- b) curba termică neregulată
- c) curba termică regulată
- d) halucinațiile fobice
- e) focare septice secundare se pot forma în diferite organe

479. Intrebarea nr. 479: I260 **Capitol:** sepsis **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru septicemie sunt corecte urmatoarele afirmatii:

- a) este o stare infectioasă generalizata, cauzata de diseminarea unui germene patogen
- b) septicemia apare mai des la persoanele, care au un status imun integru, pentru ca acestea nu limiteaza infectia in stadiul de focar primar
- c) diagnosticul consta in punerea in evidenta, prin hemocultura, a prezentei microbului in sange;
- d) o hemocultura negativa exclude diagnosticul de septicemie;
- e) este absolut necesara combaterea rapida si eficienta a sepsisului aflat in etapa de debut.

480. Intrebarea nr. 480: I261 **Capitol:** sepsis **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Simptomele si semnele caracteristice in sepsis sunt:

- a) febra ridicata, intermitenta, corespunzand descarcarii infectioase sau in platou;
- b) afebrilitatea, cel mai adesea, la persoanele tinere;
- c) la pacientii cu septicemie un este caracteristica implicarea poliorganica;
- d) starea de confuzie si dezorientarea in cazuri extrem de grave;
- e) sugestive pentru septicemie pot fi emboliile septice cutanate cu aspect hemoragic, care se afla diseminate pe trunchi sau la nivelul membrelor;

481. Intrebarea nr. 481: I262 **Capitol:** sepsis **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In septicemii:

- a) perioada de incubatie un este dependenta de starea sistemului imán si agresivitatea agentul patogen;
- b) la adult in cazurile grave se instaleaza sindromul de detresa respiratorie ;
- c) are loc deprimarea functiei cardiace cu aparitia hipotensiunii;
- d) afectarea hepatica nu se manifesta prin cresterea transaminazelor serice;
- e) sepsisul poate conduce la complicatii renale;

482. Intrebarea nr. 482: I263 **Capitol:** sepsis **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

La efectuarea investigatiilor paraclinice si instrumentale in peritada initiala a starilor septice se determina:

- a) eucocitoza cu deviere formulei leucocitare spre stinga;
- b) valori scazute a trombocitelor plasmatic;
- c) azotemie si proteinurie;
- d) limfomonocitoza;
- e) eozinifilia;

483. Intrebarea nr. 483: I264 **Capitol:** sepsis **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

În tratamentul pacienților cu septicemii se vor întreprinde următoarele măsuri:

- a) reechilibrarea hemodinamică și asigurarea suportului ventilator în cazurile grave;
- b) până la aflarea rezultatelor bacteriologice, se va începe o terapie antimicrobiană empirică;
- c) tratamentul tulburărilor de coagulare;
- d) administrarea de seruri specifice;
- e) recursul obligatoriu la tratament antiviral;

484. Întrebarea nr. 484: I265 **Capitol:** socul hipovolemic **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** n
În socul hipovolemic :

- a) este o insuficiență circulatorie acută, consecutivă unei diminuări rapide a volumului sanguin circulant;
- b) febra este indicatorul severității;
- c) presiunea sistolică scade sub 90 mm Hg sau chiar mai mult;
- d) ritmul cardiac depășește cu mult 100 pe minut;
- e) are loc în majoritatea cazurilor de toxinfecții alimentare;

485. Întrebarea nr. 485: I266 **Capitol:** socul hipovolemic **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** n
Socul hipovolemic se manifestă prin:

- a) sete, agitație sau somnolență;
- b) paloarea pronunțată a extremităților;
- c) majorarea importantă a presiunii arteriale
- d) normalitatea ritmului cardiac;
- e) printr-o micșorare a volumului urinei și dezvoltarea insuficienței renale;

486. Întrebarea nr. 486: I267 **Capitol:** socul hipovolemic **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** n

Socul hipovolemic impune:

- a) tratament aplicat precoce prin izolare și spitalizare de urgență;
- b) aplicarea perfuziilor intravenoase pentru a compensa pierderile lichidiene și a restabili o presiune arterială eficientă;
- c) prevenirea hipopotasemiei;
- d) inițierea tratamentului prin administrarea de adrenalină;
- e) traheotomia de urgență;

487. Întrebarea nr. 487: I268 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scăzut **Punctajul:** 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** n

Seroterapia se utilizează **în caz de :**

- a) febra tifoidă
- b) tifosul exantematic
- c) tetanos
- d) febra Q
- e) borelioza

488. Întrebarea nr. 488: I269 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scăzut **Punctajul:** 10 **Timp pe întrebare:** 0 sec **Autor:** n

Tetanosul debutează cu :

- a) semne catarale

- b) limfadenopatie regionala
- c) semne de intoxicatie generala
- d) tremor fibrilar in muschii adiacenti plagii
- e) febra 40 C

489. Intrebarea nr. 489: I270 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Toxina tetanica actioneaza la nivelul :

- a) plagii
- b) neuronilor motori intercalari
- c) ganglionilor limfatici regionali
- d) neuronilor senzitivi
- e) cerebelului

490. Intrebarea nr. 490: I271 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Toxina tetanica este transportata de la poarta de intrare spre maduva spinarii, formatia reticulara si bulbul rahidian pe urmatoarea cale :

- a) sange si pe traiectul nervilor
- b) exclusiv prin sange
- c) exclusiv prin limfa si pe traiectul nervilor
- d) exclusiv perineural, nepatrunzand in sange
- e) prin sange si limfa

491. Intrebarea nr. 491: I272 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Cu scop curativ serul antitetanic se administreaza in doza :

- a) 3.000 UI
- b) 100.000 - 150.000 UI
- c) 20.000 -25.000 UI
- d) 30.000 - 50.000 UI
- e) 50.000 - 75.000 UI

492. Intrebarea nr. 492: I273 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Tetanosul debuteaza cu :

- a) semne catarale
- b) semne dispeptice
- c) semne de intoxicatie generala
- d) tremor fibrilar in muschii adiacenti plagii
- e) opistotonus

493. Intrebarea nr. 493: I274 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Formele clinice in tetanos sunt :

- a) generalizata
- b) locala
- c) viscerală
- d) articulara
- e) faciala Roze

494. Intrebarea nr. 494: I275 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In tetanos se pot dezvolta urmatoarele complicatii :

- a) asfixia
- b) pneumonia
- c) miocardita
- d) peritonita
- e) encefalita microbiana

495. Intrebarea nr. 495: I276 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

In calitate de criterii de gravitate in tetanos sunt folosite :

- a) supuratiia plagii
- b) dimensiunile plagii
- c) durata acceselor convulsive
- d) frecventa acceselor convulsive
- e) prezenta dereglarilor respiratorii si cardio-vasculare

496. Intrebarea nr. 496: I277 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Semnele caracteristice tetanosului sunt :

- a) trism
- b) tenezme
- c) disfagia
- d) râs sardonice
- e) vomă

497. Intrebarea nr. 497: I344 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu

Tetanosul se intilneste mai des la:

- a) Batrini
- b) Nou-nascuti in tarile in curs de dezvoltare
- c) 20-50 ani
- d) Toate virstele
- e) Veterinari

498. Intrebarea nr. 498: I345 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu

In caz de tetanos:

- a) Poate fi hepatosplenomegalie
- b) Ficatul mărit, splina nu
- c) Ficatul si splina nu sunt mărite
- d) Splenomegalia este mai pronuntata decât hepatomegalia
- e) Hepatomegalia este mai pronuntata decât splenomegalia

499. Intrebarea nr. 499: I346 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10
Timp pe intrebare: 0 sec **Autor:** ungureanu

Toxina clostridium tetani contine:

- a) Neuraminidaza
- b) Factorul letal
- c) Hemolizina

- d) Hemaglutinina
- e) Factorul protector

500. Intrebarea nr. 500: I347 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu
Particularitatea morfologica a Clostridium tetani:

- a) Capetele retezate
- b) Nu formeaza capsule si spori
- c) Aspect de racheta
- d) Nucleul in forma de haltera
- e) Forma cocica

501. Intrebarea nr. 501: I348 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu
Sporii de Clostridium tetani rezista in sol:

- a) Saptamini
- b) Ani
- c) Zile
- d) Luni
- e) Ore

502. Intrebarea nr. 502: I349 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu
Bacilul tetanic este:

- a) Gram pozitiv
- b) Gram negativ
- c) Sporulat
- d) Anaerob
- e) Aerob

503. Intrebarea nr. 503: I350 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu
Urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru tetanus:

- a) Evolutie usoara
- b) Trismus
- c) Aerofobie
- d) Contractura tonica a musculaturii scheletice
- e) Contractiile musculare paroxistice

504. Intrebarea nr. 504: I351 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu
Alegeti fractiile exotoxinei produse de Clostridium tetani:

- a) Tetanospasmia
- b) Factorul letal
- c) Hemolizina
- d) Factorul protector
- e) O fractiune cu masa moleculara mica

505. Intrebarea nr. 505: I352 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu
Contractiile musculare paroxistice din tetanos pot fi induse de:

- a) Atingerea tegumentelor
- b) Incalcari ale dietei
- c) Lumina
- d) Zgomot
- e) Intuneric

506. Intrebarea nr. 506: I353 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu

In cazul unei plagi cu risc tetanigen la o persoana neimunizata activ se efectueaza urmatoarele:

- a) Vaccin antitetanic
- b) Toaleta plagii
- c) Ser antitetanic
- d) Imunoglobulina umana
- e) Penicilina G

507. Intrebarea nr. 507: I354 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu

Conform clasificarii epidemiologice deosebim tetanosul:

- a) Facial
- b) Traumatic
- c) Postcongestional
- d) Poststreptococic
- e) Aparut pe fondul unor procese inflamatoare

508. Intrebarea nr. 508: I355 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu

Tabloul clinic al tetanosului se caracterizeaza prin:

- a) Hipertonus muscular
- b) Hepatosplenomegalie
- c) Lipsa hepatosplenomegaliei
- d) Atonie musculară
- e) Simptomele Kerning si Lassegue pozitive

509. Intrebarea nr. 509: I356 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu

Tetanospasmina difuzeaza in organism:

- a) Pe calea fibrelor nervoase
- b) Pe calea sanguina
- c) De la nivelul sistemului nervos central
- d) Pe cale respiratorie
- e) De la poarta de intrare

510. Intrebarea nr. 510: I357 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu

Diagnosticul de tetanus poate fi suspectat in urmatoarele situatii:

- a) Plagi ce creaza conditii locale de anaerobioza
- b) Paralizii simetrice
- c) Trismus decelat la o persoana in virsta
- d) Sugar provenit din tari in curs de dezvoltare ce prezinta dificultati de alimentare
- e) Anizocorie

511. Intrebarea nr. 511: I358 **Capitol:** tetanos **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu

Tetanosul este defenit ca:

- a) O boala infectioasa
- b) O parazitoza
- c) Provocata de un bacil Gram negativ
- d) Boala este data de efectul neurogen al exotoxinei
- e) Toxina blocheaza functia neuronilor intercalari

512. Intrebarea nr. 512: I278 **Capitol:** SIRS **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Criteriile sindromului de răspuns inflamator sistemic (SRIS) sunt:

- a) temperatura subfebrilă;
- b) tahicardie;
- c) tahipnee;
- d) leucocitoza;
- e) trebuie să reunească doar unul din criteriile prezentate;

513. Intrebarea nr. 513: I279 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati cea mai frecventă cauză a toxiinfecțiilor alimentare .

- a) helminti
- b) amibe
- c) bacterii conditionat patogene
- d) chlamidii
- e) rickettsii

514. Intrebarea nr. 514: I280 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Pentru care toxiinfecție alimentară este caracteristică enterita necrotică ?

- a) stafilococică
- b) streptococică
- c) cu *Clostridium perfringens*
- d) cu *Proteus*
- e) cu *Klebsiella*

515. Intrebarea nr. 515: I281 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Complicația cea mai frecventă în toxiinfecțiile alimentare este :

- a) șocul toxi-infecțios
- b) șocul anafilactic
- c) edemul cerebral
- d) glomerulonefrită
- e) peritonită

516. Intrebarea nr. 516: I282 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Tabloul clinic în toxiinfecțiile alimentare determinate de stafilococi se manifestă prin :

- a) greață
- b) vomă
- c) dureri în regiunea epigastrică
- d) scaun diareic cu mucus și striuri de sânge
- e) tenesme

517. Intrebarea nr. 517: I283 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Semnele caracteristice pentru toxiinfecțiile alimentare sunt :

- a) voma repetată
- b) durerile în porțiunile superioare ale abdomenului
- c) sindromul hepatolienal
- d) scaunul lichid frecvent, apos
- e) semnul Pastia pozitiv

518. Intrebarea nr. 518: I284 **Capitol:** toxicoinfecții **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Metodele de diagnostic specific al toxiinfecțiilor alimentare sunt :

- a) investigații bacteriologice ale maselor vomitive
- b) investigații bacteriologice ale maselor fecale
- c) frotiul sanguin
- d) investigații serologice
- e) însămânțări pe culturi celulare vii

519. Intrebarea nr. 519: I313 **Capitol:** toxicoinfecții **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scăzut

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Boala diareică acută se definește ca:

- a) o stare caracterizată prin depășirea a 1 scaun neoformate pe zi în cantități de mai mult de 300 gr.pe zi cu o durată de mai puțin de 14 zile
- b) o stare caracterizată prin depășirea a 2 scaune neoformate pe zi în cantități de mai mult de 300 gr.pe zi cu o durată de mai puțin de 14 zile.
- c) o stare caracterizată prin depășirea a 3 scaune neoformate pe zi în cantități de mai mult de 300 gr.pe zi cu o durată de mai puțin de 14 zile
- d) o stare caracterizată prin depășirea a 3 scaune neoformate pe zi în cantități de mai mult de 300 gr.pe zi cu o durată de mai puțin de 7 zile
- e) o stare caracterizată prin depășirea a 4 scaune neoformate pe zi în cantități de mai mult de 300 gr.pe zi cu o durată de mai puțin de 10 zile

520. Intrebarea nr. 520: I314 **Capitol:** toxicoinfecții **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scăzut

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Toxiinfecția alimentară cu *Cl. Perfringens* care secretă enterotoxina tipul F se caracterizează prin:

- a) vărsături intense în lipsa diareei
- b) diaree suportată pe picioare
- c) scaun verzui cu mucus
- d) scaun riziform
- e) enterocolită necrozantă, hemoragică, cu evoluție severă

521. Intrebarea nr. 521: I315 **Capitol:** toxicoinfecții **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scăzut

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Prin tenesme subînțelegem

- a) chemări false la scaun
- b) chemări imperative la scaun
- c) chemări false la scaun cu dureri în hipoabdomen
- d) dureri rectale cu iradiere sacrală în timpul chemării la defecare și timp de 3 - 5 min. după
- e) chemări imperative la scaun cu dureri în regiunea iliacă stângă

522. Intrebarea nr. 522: I316 **Capitol:** toxicoinfecții **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scăzut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Cel mai frecvent tenesmele se atestă în

- a) salmoneloză
- b) toxiinfecție alimentară cu stafilococcus aureus
- c) escherichioza enterotoxigenă
- d) shigelloză
- e) infecția enterovirală

523. Intrebarea nr. 523: I317 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi
Enumărați complicația secundară leziunii intestinale cronice în shigelloză:

- a) șocul toxic-infecțios
- b) sindrom de malabsorbție pînă la cașexie
- c) șocul hipovolemic
- d) ciroza hepatică
- e) encefalopatia

524. Intrebarea nr. 524: I318 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi
Eclozarea sporilor botulinici cu apariția formelor vegetative și elaborarea ulterioară a toxinei în aliment:

- a) schimbă culoarea produsului
- b) schimbă mirosul produsului
- c) schimbă gustul produsului
- d) puțin modifică calitățile organoleptice ale preparatului
- e) nu modifică în nici un fel calitățile organoleptice ale preparatului

525. Intrebarea nr. 525: I319 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi
După ingestie toxina botulinică se resoarbe cu rapiditate:

- a) încă din cavitatea bucală
- b) încă din stomac
- c) încă din duoden
- d) începând cu intestinul subțire
- e) doar în intestinul gros

526. Intrebarea nr. 526: I320 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi
De cele mai multe ori botulismul debutează cu:

- a) febră
- b) hidrofobie
- c) greață
- d) cefalee
- e) artralгии

527. Intrebarea nr. 527: I321 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi
De cele mai multe ori botulismul debutează cu:

- a) diplopie
- b) midriază
- c) febră
- d) câteva scaune semilichide

e) disfagie

528. Intrebarea nr. 528: I322 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** Liarovoi

Mecanismul patogenetic al toxiinfecției alimentare bacetriene de tip infecțios poate fi:

- a) neinflamator
- b) neurotoxic
- c) infecțios-alergic
- d) inflamator
- e) bacteriemic

529. Intrebarea nr. 529: I323 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** Liarovoi

Mecanismul patogenetic al toxiinfecției alimentare bacetriene de tip toxic poate fi:

- a) neinflamator
- b) prin producere de neurotoxine
- c) prin producere de citotoxine
- d) inflamator
- e) prin producere de enterotoxine

530. Intrebarea nr. 530: I324 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** Liarovoi

Toxiinfecția alimentară cu *Staphylococcus aureus* enterotoxigen se caracterizează prin :

- a) incubăția este de la 30 minute până la 6 ore
- b) diaree semnificativă însoțită de colică abdominală
- c) febră de mare amplitudine
- d) greață intensă și vărsături repetate
- e) febra este absentă sau de mică amplitudine

531. Intrebarea nr. 531: I325 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** Liarovoi

Toxiinfecția alimentară cu *Cl. Perfringens* care secretă enterotoxina tipul A se caracterizează prin :

- a) incubăția este de la 30 minute până la 6 ore
- b) diaree apoasă
- c) dureri abdominale
- d) febra moderată sau lipsește
- e) vărsături intense

532. Intrebarea nr. 532: I326 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** Liarovoi

Toxiinfecția alimentară cu *B. cereus* se caracterizează prin:

- a) implicate mai frecvent în producerea toxiinfecției alimentare sunt orezul și preparatele din orez
- b) enterotoxina termostabilă determină o toxiinfecție alimentară cu incubăție scurtă (1 - 6 ore), vărsături alimentare
- c) enterotoxina termostabilă determină în majoritatea cazurilor scaune diareice apoase și colici abdominale
- d) enterotoxina termolabilă determina în majoritatea cazurilor scaune diareice apoase și colici abdominale
- e) alimentele pot fi contaminate chiar de la sursă (laptele de la mastita vacilor) sau ulterior pe durata preparării și/sau manipulării, de la persoane cu leziuni cutanate stafilococice (panariciu, piodermita, furuncul) sau cu portaj nasofaringian

533. Intrebarea nr. 533: I327 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Shigeloza poate fi provocată de:

- a) Shigella flexneri
- b) Shigella enteritidis
- c) Shigella haemoliticus
- d) Shigella sonnei
- e) Shigella dysenteriae

534. Intrebarea nr. 534: I328 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Pentru shigelloză sunt caracteristice:

- a) dureri abdominale sub formă de crampe localizate în hipoabdomen, mai frecvent pe stînga
- b) scaun riziform
- c) greață
- d) scaun verzui
- e) vomă repetată (în formele gastroenterice și gastroenterocolitice)

535. Intrebarea nr. 535: I329 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Pentru shigelloză sunt caracteristice:

- a) dureri abdominale sub formă de crampe localizate în hipoabdomen, mai frecvent pe stînga
- b) scaun riziform
- c) greață
- d) scaun verzui
- e) aspectul "scuiatului rectal" al scaunului

536. Intrebarea nr. 536: I330 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Enumerați complicațiile la distanță după vindecarea aparentă în shigelloză:

- a) colite cronice
- b) hepatita
- c) insuficiența renală
- d) artrita reactivă prin mecanism imunologic
- e) dispepsii rebele

537. Intrebarea nr. 537: I331 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Se consideră că evoluția șocului hipovolemic se desfășoară în trei faze mai mult sau mai puțin delimitate practic:

- a) decompensată reversibilă
- b) progresivă
- c) compensată
- d) ireversibilă
- e) prodromală

538. Intrebarea nr. 538: I332 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

In socul hipovolemic compensat:

- a) poate avea o finalitate fericită chiar și fără intervenție terapeutică
- b) poate avea o finalitate fericită doar in cazul unei intervenții terapeutice

- c) este însoțit de scăderea TA
- d) este însoțit de scaderea diurezei
- e) este însoțit de scăderea ritmului cardiac

539. Intrebarea nr. 539: I333 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** Liarovoi

In socul hipovolemic progresiv:

- a) poate avea o finalitate fericită chiar și fără intervenție terapeutică
- b) apare la câteva zeci de minute de la tulburările inițiale cauzatoare
- c) apare la câteva ore de la tulburările inițiale cauzatoare
- d) este însoțit de scăderean ritmului cardiac
- e) este însoțit de creșterea ritmului cardiac

540. Intrebarea nr. 540: I334 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** Liarovoi

Șocul hipovolemic ireversibil :

- a) administrarea în perfuzie a lichidelor pentru refacerea volemiei nu produce nici o ameliorare a presiunii arteriale și a celorlalte funcții vitale
- b) administrarea în perfuzie a lichidelor pentru refacerea volemiei produce ameliorare a presiunii arteriale și a celorlalte funcții vitale
- c) se determină tahicardia
- d) se determină scăderea ritmului cardiac
- e) cel mai des pulsul nu se determină

541. Intrebarea nr. 541: I335 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** Liarovoi

Marcați afirmațiile corecte:

- a) toxina botulinică A este cea mai puternică, cu răspîndire predominantă pe continentul european
- b) toxina botulinică A este cea mai puternică, cu răspîndire predominantă pe continentul american
- c) toxina botulinică B este mai puțin toxică, întâlnită mai frecvent în Europa
- d) toxina botulinică E este cea mai puțin toxică, întâlnită după ingestie de pește
- e) toxina botulinică E este cea mai toxică, întâlnită după ingestie de ciuperci

542. Intrebarea nr. 542: I336 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** Liarovoi

Formele botulismului sunt:

- a) botulismul cefalic
- b) botulismul respirator
- c) botulismul ca toxiinfecție alimentară
- d) botulismul lezional
- e) botulismul oftalmoplegic

543. Intrebarea nr. 543: I337 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** Liarovoi

Formele botulismului sunt:

- a) botulismul localizat
- b) accidental/chirurgical
- c) botulismul respirator
- d) forma cutanată
- e) botulismul intestinal

544. Intrebarea nr. 544: I338 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Formele botulismului sunt:

- a) botulismul ca toxiinfecție alimentară
- b) botulismul infantil
- c) botulismul intestinal
- d) botulismul generalizat
- e) botulismul localizat

545. Intrebarea nr. 545: I339 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

De cele mai multe ori botulismul debutează cu:

- a) febră
- b) hidrofobie
- c) greață
- d) posibil câteva scaune lichide-semilichide
- e) dureri abdominale usare

546. Intrebarea nr. 546: I340 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:**

10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Caracteristicile în tabloul clinic al botulismului sunt:

- a) febra
- b) păstrarea stării de conștiență a pacientului
- c) absența febrei
- d) paralizările asimetrice
- e) progresia paralizărilor (în suprafață și intensitate)

547. Intrebarea nr. 547: I342 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Pacientul suportând botulism prezintă:

- a) midriază
- b) semnul Argille-Robertson
- c) semnul Argille-Robertson inversat
- d) mioză
- e) ptoză palpebrală

548. Intrebarea nr. 548: I343 **Capitol:** toxicoinfectii **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** I.Iarovoi

Pacientul suportând botulism prezintă:

- a) semnul Argille-Robertson
- b) strabism
- c) mioză
- d) midriază
- e) paraliza epiglotei

549. Intrebarea nr. 549: I285 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut

Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Ce afectiuni oculare se pot intilni in tularemie:

- a) coreoretinita
- b) iridociclita
- c) conjunctivita eroziv-ulceroasa
- d) conjunctivita membranoasa

e) conjunctivita purulentă

550. Intrebarea nr. 550: I286 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Din ce grup de infectii face parte tularemia ?

- a) virale
- b) antropozoonoze bacteriene
- c) antropozoonoze transmise
- d) antropozoonoze bacteriene
- e) rickettsioze antropozoonoze

551. Intrebarea nr. 551: I287 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care afirmatie referitoare la tularemie nu este corecta?

- a) Francisella tularensis este aerogena, Gram negativa
- b) Dupa evolutie tularemia poate fi acuta, latentă, recidivanta
- c) Este o antropozoonoză
- d) Perioada de incubatie dureaza 3-7 zile, uneori pana la 10 zile
- e) Durata febrei oscileaza in limite mari de la 6 la 30 zile

552. Intrebarea nr. 552: I288 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care afirmatie referitoare la tularemie nu este corecta:

- a) Pentru examenul de laborator se folosesc metodele bacteriologica, biologica, serologica
- b) In forma orofaringiana se afecteaza ambele amigdale
- c) Buboanele sunt putin durabile
- d) Substratul morfologic principal il constituie granuloamele tularimice specifice
- e) Mecanismele de infectare sunt: prin contact direct, pe cale digestiva, prin aspiratie, transmisibila

553. Intrebarea nr. 553: I289 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care afirmatie referitoare la investigatiile de laborator in tularemie nu este corecta?

- a) Reactiile serologice se fac obligatoriu in seruri pare
- b) Dupa boala suportata anticorpi se pastreaza pe parcursul mai multor ani
- c) Semnul caracteristic pentru majoritatea formelor este sporirea in volum a diferitor ganglioni limfatici
- d) Tratamentul se aplica doar in conditii de stationar
- e) Proba alergica cu tularimina ajuta la diferentierea infectiei acute de cea trenanta

554. Intrebarea nr. 554: I290 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Bubonul tularimic este :

- a) Regional unilateral
- b) Intotdeauna bilateral
- c) Confluent
- d) Aderat de tesutul adiacent
- e) Foarte dureros

555. Intrebarea nr. 555: I291 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Care formă clinică nu este caracteristică tularemiei:

- a) angio-bubonica
- b) reziduala, cu afectarea aparatului locomotor
- c) oculo-bubonica
- d) cu lezarea predominanta a organelor respiratorii
- e) recidivanta

556. Intrebarea nr. 556: I292 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
 Care afirmatie este falsă privitor la tularemia pulmonara

- a) boala se inregistreaza preponderent toamna-iarna
- b) tusea este intotdeauna umeda, cu sputa purulenta, frecvent cu hemoptizii
- c) procesul inflamator incepe in hilul pulmonar, extinzandu-se la periferii
- d) pneumonia are o evolutie grava, trenanta
- e) ganglionii limfatici hilari, paraheali si mediastinali sunt mriti din a 7 zi de boala

557. Intrebarea nr. 557: I293 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
 Pentru forma anginobubonica de tularemie e caracteristic :

- a) febra 39-40 C
- b) amigdalita ulcero-necrotica unilaterala
- c) amigdalita fibrinoasa bilaterala
- d) limfadenopatie regionala
- e) limfadenopatie generalizata

558. Intrebarea nr. 558: I294 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
 Indicati afirmatiile corecte referitoare la tularemie

- a) Forma generalizata evolueaza cu toxicoza manifesta, uneori cu delir
- b) Fata pacientilor este hiperemiata, vasele sclerelor injectate, conjunctivele hiperemiate
- c) Semnul caracteristic pentru majoritatea formelor este afectarea renala severa cu instalarea insuficientei renale acute
- d) Limfadenitele se deceleaza cu mult inaintea anginei in forma angino-bubonica
- e) Infectia este o zooantroponoza cu focar natural

559. Intrebarea nr. 559: I295 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
 Indicati afirmatiile corecte referitoare la tularemie

- a) Mecanismele de infectare a omului sunt foarte variate
- b) Buboanele sunt mai frecvent multiple, ca exceptie - solitare
- c) La poarta de intrare pe piele sau pe mucoase deseori apare afectul primar cu limfadenita regionala primara
- d) Tratamentul se poate face cu streptomocina, gentamicina, tetraciclina, ciprofloxacina
- e) Ulcerele in forma ulcero-bubonica se disting prin sensibilitate vadita la durere

560. Intrebarea nr. 560: I296 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
 Indicati afirmatiile corecte referitoare la tularemie

- a) Buboanele sunt putin dolore, au contururi nete, cu dimensiuni de 1-5 cm
- b) Buboanele sunt foarte dolore, au contururi nete, cu dimensiuni de 1-5 cm
- c) Forma ulcero-bubonica se caracterizeaza prin prezenta carbuncului foarte dureros
- d) Dispensarea convalescentilor se face timp de 6-12 luni
- e) In 30-50% cazuri in 2-4 saptamani se produce ramolirea, apoi deschiderea spontana a bubonului

cu eliminare de puroi cremos

561. Intrebarea nr. 561: I297 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10
Timp pe intrebare: 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatiile corecte referitoare la tularemie

- a) La aplicarea tratamentului antimicrobian pronosticul este favorabil, letalitate fiind de 0,5%
- b) In forma generalizata se instaleaza hepatosplenomegalia
- c) In formele cu lezarea tubului digestiv durerile abdominale uneori pot fi considerate eronat drept "abdomen acut"
- d) In formele cu lezarea tubului digestiv se formeaza granuloame pe traiectul tractului gastrointestinal
- e) Forma ulcero-bubonica se caracterizeaza prin prezenta unui edem gelatinos prinuntat

562. Intrebarea nr. 562: I298 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatiile corecte referitoare la tularemie

- a) In forma ulcero-bubonica este caracteristic tremorul fibrilar in muschii adiacenti plagii
- b) Forma cea mai raspandita este varianta carbunoasa
- c) In forma angino-bubonica ulcerile sunt adanci se vindeca greu
- d) In forma angino-bubonica limfadenita se declara simultan cu amigdalita
- e) In forma oculo-bubonica ganlionii limfatici regionali sunt mariti

563. Intrebarea nr. 563: I299 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10
Timp pe intrebare: 0 sec **Autor:** n

Indicati afirmatiile corecte referitoare la tularemie

- a) Omul bolnav poate fi sursa de infectie pentru personalul medical
- b) Leziunile renale sunt minime
- c) Sursa principala in conditii naturale este constituita de numeroase rozatoare
- d) Francisella tularensis este distrusa la fierbere
- e) Semnul Podalka se depisteaza intotdeauna in tularemie cu afectarea tubului digestiv

564. Intrebarea nr. 564: I359 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu

Care afirmatie referitor la tularemie este corecta:

- a) Durata febrei nu depeseste 1 saptamina
- b) Tularemia este o antroponoza
- c) Francesella tularensis este Gram pozitiva
- d) Francesella tularensis este Gram negativă
- e) Letalitatea in tularemie este >10%

565. Intrebarea nr. 565: I360 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu

Ce afirmatie referitor la investigatiile de laborator in tularemie este corecta:

- a) Metoda biologica este mult mai rezultativa decit cea bacteriologica
- b) Proba alergica se foloseste in diagnosticarea tardiva a bolii
- c) Reactia de aglutinare devine pozitiva din primele zile de boala
- d) Dupa boala suportata titrul de anticorpi se pastreaza 1-2 luni
- e) Daca RA cu diagnosticul tularemie este 1:60 nu necesita de derminat cresterea titrului de anticorpi in seruri perechi

566. Intrebarea nr. 566: I361 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu

Ce afirmatie referitor la tularemie este corecta:

- a) In forma orofaringiana membranele false se detaseaza usor
- b) Ficatul si splina nu sufera
- c) Diagnosticul se face exclusiv in baza investigatiilor serologice
- d) Bubonul este de dimensiuni mici
- e) Substratul morfologic principal il constituie granuloamele specifice

567. Intrebarea nr. 567: I362 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu

Indicati sursele de infectie in tularemia:

- a) Ovine,porcine,bovine
- b) Rozatoare
- c) Insecte hematogene
- d) Felinele
- e) Omul bolnav

568. Intrebarea nr. 568: I363 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu

Caile de infectare in tularemia sunt:

- a) Congenitala
- b) Perorala
- c) Sexuala
- d) Percutanata
- e) Aerogena

569. Intrebarea nr. 569: I364 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu

Indicati manifestarile clinice caracteristice formei bubonice a tularemiei:

- a) Buboane intens dolore
- b) Buboane multiple nonregionale
- c) Reabsorbtiia sau sclerozarea bubonului
- d) Buboane putin dolore
- e) Ramolirea bubonului in 2-4 saptamini

570. Intrebarea nr. 570: I365 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu

Indicati manifestarile clinice caracteristice formei abdominale a tularemiei:

- a) Hepatosplenomegalie
- b) Sindrom dispeptic
- c) Hipertrofia ganglionilor limfatici mezenterici
- d) Simptomul Podalca pozitiv
- e) Tenezme

571. Intrebarea nr. 571: I366 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu

Care sunt variantele de evoluție in tularemie:

- a) Portaj cronic asimptomatic
- b) Acuta
- c) Trenanta
- d) Recidivanta
- e) Reziduala

572. Intrebarea nr. 572: I367 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu
Indicati afirmatiile corecte referitor la tularemie:

- a) Curba termica are un caracter remittent cu o durata de 3 saptamini
- b) Intradermoreactia cu tularina se utilizeaza pentru diagnosticul precoce
- c) In hemoleucograma poate fi leucopenie
- d) In hemoleucograma poate fi hipereozinofelie
- e) In forma cutanata afectul primar este inconjurat de edem moale

573. Intrebarea nr. 573: I368 **Capitol:** tularemia **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** ungureanu
Enumerati manifestarile clinice caracteristice tularemiei formeii septicemice:

- a) Insuficienta renala acuta
- b) Sindrom de impregnare infectioasa
- c) Hepatosplenomegalie
- d) Diaree sangvinolenta profuza
- e) Hiperemia si pastozitatea fetei

574. Intrebarea nr. 574: I300 **Capitol:** yersinioza **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
Agentii patogeni ai yersiniozelor sunt :

- a) virusuri
- b) protozoare
- c) bacterii
- d) ricketсии
- e) chlamidii

575. Intrebarea nr. 575: I301 **Capitol:** yersinioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
Sunt maladii provocate de Yersinii patogene :

- a) listerioza
- b) yersinioza intestinala
- c) bruceleza
- d) pseudotuberculoza
- e) pesta

576. Intrebarea nr. 576: I302 **Capitol:** yersinioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
Yersinia enterocolitica se tratează cu:

- a) aminoglicozide
- b) doxaciline
- c) peniciline
- d) fluorchinolone
- e) metronidazol

577. Intrebarea nr. 577: I303 **Capitol:** yersinioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** n
Cele mai frecvente forme in yersinioza intestinală sunt:

- a) enterita sau enterocolita
- b) adenita mezenterica si ileita terminala, care poate fi usor confundata cu apendicita acuta

- c) forma septicemica insotita uneori de complicatii inflamatorii: artrita reactiva si eritem nedos
- d) forma cutanata caracterizata printr-un placard fierbinte, edematos, eritematos, bine delimitat cu adenopatie loco-regionala sensibila
- e) faringita exudativa cu limfadenopatie laterocervicala, esentiala, de lunga durata

578. Intrebarea nr. 578: I450 **Capitol:** yersinioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

In tratamentul yersiniozelor se folosesc antibiotice

- a) nitrofuranele
- b) aminoglicozidele

- c) levomicetina
- d) antimicoticele
- e) tetraciclinile

579. Intrebarea nr. 579: I451 **Capitol:** yersinioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Materialele pentru diagnosticul bacteriologic al yersiniozei enterocolitice

- a) sange, licvorul
- b) materii fecale
- c) aspiratii din rezecate de ganglioni limfatici si appendix
- d) aspiratii nazale
- e) aspiratii vaginale

580. Intrebarea nr. 580: I452 **Capitol:** yersinioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Testele serologice folosite in yersinioza enterocolitica

- a) reactia de aglutinare (RA)
- b) reactia de hemaglutinare (RHAI)
- c) examen a biopiantelor ganglionilor limfatici
- d) reactia indirecta imunofluorescenta
- e) Western-blot

581. Intrebarea nr. 581: I453 **Capitol:** yersinioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Diagnosticul yersiniozei enterocolitice este bazat pe metodele

- a) bacteriologică
- b) bacterioscopică
- c) serologică
- d) imagistică
- e) rengenologică

582. Intrebarea nr. 582: I454 **Capitol:** yersinioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Manifestările clinice a yersiniozei enterocolitice

- a) gastroenterita, enterocolita, gastroenterocolita
- b) ileita terminala, mezadenita, apendicita
- c) eruptie urticariene, maculoasa, maculopapuloasa in regiunea a 2-3 articulatii mari
- d) eruptie urticariana pe tot corpul
- e) miocardita, aritmie, adinamie

583. Intrebarea nr. 583: I455 **Capitol:** yersenioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Caracteristica yersineozei enterocolitice

- a) durata incubatiei 1-6 zile
- b) intoxicatia se manifesta cu febra, cefalee, mialgii, greata, voma, dureri in abdomen,
- c) dureri in articulatii
- d) durata incubatiei 3-18 zile
- e) durata 12-15 zile cu scaun lichid , pastos cu mucus, rareori sange si deshidratare

584. Intrebarea nr. 584: I456 **Capitol:** yersenioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Indicati formele clinice a yersiniozei enterocolitice

- a) gastroenteritica
- b) enterocolitica
- c) gastroenterocolitica
- d) gastrica
- e) duodenala

585. Intrebarea nr. 585: I458 **Capitol:** yersenioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Localizarea eruptiei în pseudotuberculoza

- a) pe tot corpul
- b) pe maini sub forma de manusi
- c) pe picioare sub forma de ciorapi
- d) pe gat si corp sub forma de glugă
- e) numai pe maini si picioare

586. Intrebarea nr. 586: I459 **Capitol:** yersenioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

In tratamentul pseudotuberculozei se folosesc

- a) nitrofurane
- b) tetraciline.
- c) levomicitina
- d) aminoglicozide
- e) antifungice

587. Intrebarea nr. 587: I460 **Capitol:** yersenioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Indicati perioadele evolutiei a pseudotuberculozei

- a) perioada de incubatie (3-18) zile
- b) perioada incipienta cu febra, slabiciune, cefalee, dureri articulare, musculare
- c) perioada de stare cu exantem maculopapulos
- d) perioada afectărilor organice
- e) perioada de incubatie 1- 6 zile

588. Intrebarea nr. 588: I461 **Capitol:** yersenioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Indicati perioadele evolutiei a pseudotuberculozei

- a) perioada de incubatie (3-18) zile
- b) perioada incipienta cu febra, slabiciune, cefalee, dureri articulare, musculare
- c) perioada de stare cu exantem maculopapulos

- d) perioada afectărilor organice
- e) perioada de incubatie 1- 6 zile

589. Intrebarea nr. 589: I462 **Capitol:** yersenioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Indicati formele evolutive a y.pseudotuberculosis

- a) forma febrilă acuta (febra scarlatinoasa)
- b) septicemica
- c) evolutia usoara, medie, grava
- d) formele metapseudoyerseniozice
- e) formele paraalergice

590. Intrebarea nr. 590: I463 **Capitol:** yersenioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Indicati formele clinice a pseudotuberculozei localizate

- a) intestinala (gastroenterita, enterocolita)
- b) limfadenita mezenteriala, ileita terminala
- c) hepatita
- d) pielonefrita
- e) dermatita alergica

591. Intrebarea nr. 591: I464 **Capitol:** yersenioza **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Bacteria pseudotuberculoasa este

- a) sensibilă la temperaturi inalte si fierbere
- b) creste pe medii, ramane viabila la t^0 80-100⁰
- c) este mobilă la t^0 18-20⁰, nu formeaza spori este gramnegativ
- d) creste pe medii obisnuite cu ph 7,2- 7.4
- e) formeaza spori este gram pozitiva

592. Intrebarea nr. 592: I465 **Capitol:** infectiile paratifoide **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Sursa de infectie in paratifoidă A

- a) cainii
- b) caprinele
- c) bovinele
- d) rozatoarele
- e) omul bolnav

593. Intrebarea nr. 593: I466 **Capitol:** infectiile paratifoide **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Curbele termice in febra paratifoida A

- a) continua
- b) normala
- c) remitenta
- d) intermitenta
- e) septica sau hectica

594. Intrebarea nr. 594: I467 **Capitol:** infectiile paratifoide **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu

Schimbarile caracteristice febrei paratifoide B

- a) intoxicatie generalizata (febra,cefalee, paliditate)

- b) greata, voma, semne meningiene pozitive
- c) eruptie la 10-a zi a maladiei
- d) scaunul la bolnav lichid din primele zile ale maladiei
- e) eruptia apare la 7-8 zi a maladiei

595. Intrebarea nr. 595: I468 **Capitol:** infectiile paratifoide **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Febra paratifoida B

- a) evolutia frusta, abortiva, relativ usoara si medie
- b) formele generalizate sunt cele mai frecvente
- c) ingestia de germeni agresori determina gastroenterocolita acuta
- d) nu se deosebeste de febra tifoida
- e) mai rar forme septice cu meningita purulenta, septicopiemie, leziuni hepatice

596. Intrebarea nr. 596: I469 **Capitol:** infectiile paratifoide **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Schimbarea patomorfologica in intestin în febra paratifoida A:

- a) intestinul subtire afectat
- b) intestinul gros afectat
- c) duodenul
- d) stomacul
- e) sigmoidul

597. Intrebarea nr. 597: I470 **Capitol:** infectiile paratifoide **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** botezatu
Manifestari clinice principale in febra paratifoida A:

- a) febra inalta treptat aparuta
- b) semne de intoxicare generala
- c) marirea ficatului si a splinei
- d) semne meningiene pozitive
- e) afectarea rinichilor

598. Intrebarea nr. 598: I588 **Capitol:** afectarea snc **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting rascov
Pentru confirmarea etiologiei meningitei bacteriene este necesara investigatia:

- a) tomografie
- b) rezonanta magnetica
- c) punctie sternala
- d) examenul bacteriologic al LCR
- e) laparoscopie diagnostica

599. Intrebarea nr. 599: I589 **Capitol:** afectarea snc **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut **Punctajul:** 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting rascov
Cel mai frecvent semn de iritatie meningeala intalnit este:

- a) semnul Murson
- b) redoarea cefei
- c) semnul Kernig
- d) semnul Rozenberg
- e) semnul Brudzinski

600. Intrebarea nr. 600: I590 **Capitol:** afectarea snc **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting rascov
Pentru confirmarea etiologica a meningo-encefalitelor virale este necesară:

- a) proba biologica
- b) testul PCR pentru identificarea acizilor nucleici virali din LCR
- c) decelarea miilor de polimorfonuceare în lichidul cefalorahidian
- d) testul intradermal-alergic
- e) testul PCR pentru identificarea acizilor nucleici din exsudatul faringian

601. Intrebarea nr. 601: I591 **Capitol:** afectarea snc **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10
Timp pe intrebare: 0 sec **Autor:** poting rascov
Meningita bacteriana acuta poate evolua catre următoarele complicatii:

- a) hidrocefalia
- b) hipofertilitatea
- c) abcesul cerebral
- d) detresa respiratorie acută
- e) pareze si paralizii ale nervilor cranieni

602. Intrebarea nr. 602: I592 **Capitol:** afectarea snc **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10
Timp pe intrebare: 0 sec **Autor:** poting rascov
Pentru meningita cu lichid clar sunt caracteristice urmatoarele modificari:

- a) lichidul cefalorahidian are 200 leucocite/ml, predominante sunt limfocitele
- b) 20-25% din pacienți pot avea predominanță de polimorfonucleare neutrofile în primele zile a bolii
- c) in toate cazurile este caracteristica scaderea considerabile a glucozei si clorizilor
- d) lichidul cefalorahidian are 12000 leucocite/ml, predominante sunt neutrofilele

e) macroscopic: lichidul cefalorahidian este transparent

603. Intrebarea nr. 603: I593 **Capitol:** afectarea snc **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu **Punctajul:** 10
Timp pe intrebare: 0 sec **Autor:** poting rascov
Contraindicatii catre punctia lombara sunt:

- a) lipsa semnelor meningiene
- b) instabilitatea hemodinamica
- c) coma cerebrala
- d) prezenta convulsiilor
- e) febra indelungata

604. Intrebarea nr. 604: I594 **Capitol:** afectarea snc **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting rascov
Principalele semne ale meningitei sunt:

- a) semnul Filipovici
- b) cefalee accentuata
- c) semnul Govorov-Godelie
- d) durere localizata de-a lungul coloanei vertebrale spontana sau provocata de miscare
- e) voma de caracter central

605. Intrebarea nr. 605: I595 **Capitol:** afectarea SNC **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting rascov

Momentele anamnestice obligatorii in evaluarea pacientului suspect de encefalita virala sunt:

- a) localizarea geografica si istoria calatoriilor recente
- b) varsta
- c) contactul cu animalele
- d) conditiile habituale
- e) antecedente cum ar fi intepaturi de insecte sau muscaturi de animale

606. Intrebarea nr. 606: I596 **Capitol:** afectarea SNC **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting rascov

Asocierea semnelor clinice indicate mai jos permite suspectarea maladiilor - după cum urmează:

- a) icterul - doar cu leptospiroza
- b) echimozele insotesc infectia meningococica
- c) parotidita paraauriculara si submandibulara pot fi asociate cu oreionul
- d) pneumonia - doar cu infectia pneumococica
- e) simptomele catarale, gastrointestinale si eruptiile sunt manifeste in infectia enterovirala

607. Intrebarea nr. 607: I597 **Capitol:** afectarea SNC **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting rascov

Semnele ce reflecta perturbarea functiilor cerebrale, caracteristice pentru encefalita, sunt urmatoarele:

- a) febra indelungata
- b) modificarile de comportament
- c) semnele neurologice de focar
- d) semnele catarale
- e) convulsiile

608. Intrebarea nr. 608: I598 **Capitol:** afectarea SNC **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting rascov

Tratamentul in meningoencefalita consta in administrarea:

- a) Aciclovirului ca preparat de electie in meningoencefalitele virale
- b) Serurilor polivalente

- c) Dexametazonei în doze mari pentru prevenirea edemului cerebral
- d) Diazepam prin injectare intravenoasă în cazul convulsiilor
- e) Gamaglobulinelor specifice

609. Intrebarea nr. 609: I620 **Capitol:** infectii eruptive **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting

Elemente în forma de vezicule, dispuse predominant la nivelul valului palatin, limbei, mucoasei cavitatii bucale și la nivelul extremitatilor sunt caracteristice pentru infectia cu:

- a) Francisella tularensis
- b) Neiseria meningitides
- c) Salmonella typhi-murium
- d) Streptococcus pyogenes
- e) Virusul Cocksackie

610. Intrebarea nr. 610: I621 **Capitol:** infectii eruptive **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting

Tratamentul etiotrop al pacientului cu infectia varicelo-zosteriana, recomandat în mai puțin de 72 de ore de la aparitia simptomelor include urmatoarele preparate:

- a) acyclovir (Zovirax)
- b) valacyclovir (Valtrex)
- c) famciclovir (Famvir)
- d) corticosteroizii (Prednisone)
- e) serul specific

611. Intrebarea nr. 611: I622 **Capitol:** infectii eruptive **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting

Eruptii cutanate scralatinoforme asociate cu amigdalita acuta, limfadenopatia,

hepatosplenomegalia și aparitia mononuclearilor atipici în hemograma sunt caracteristice:

- a) mononucleozei infectioase
- b) tifosului abdominal
- c) borreliozei Lyme
- d) pestei
- e) rujeolei

612. Intrebarea nr. 612: I623 **Capitol:** infectii eruptive **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting

Eruptia cu aparitia pe buze, conturul acestora sau în imediata lor vecinatate, sub forma unor vezicule dureroase, pe fond eritematos, care se sparg și se acoperă cu cruste în câteva zile este caracteristica pentru:

- a) Herpes simplex
- b) Leptospiroza
- c) Infectia meningococica

- d) Parotidita epidemica
- e) Hepatita virala acuta

613. Intrebarea nr. 613: I624 **Capitol:** infectii eruptive **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting

Pentru efectuarea diagnosticului diferential al maladiilor eruptive o importanta deosebita o prezinta:

- a) Distribuția si localizarea eriptiilor
- b) Varsta pacientului
- c) Natura leziunii primare
- d) Modificarile secundare
- e) Efectul preparatelor antiinflamatorii

614. Intrebarea nr. 614: I625 **Capitol:** infectii eruptive **Mod de punctare:** A1 **Grad de dificultate:** scazut
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting

Pentru care din infectiile enumerate este caracteristic eruptii punctiforme sau fin-papulare, difuz-confluente asociat cu faringita, limba zmeurie, zone lineare de eritem mai intens (liniile Pastia-Grozoci):

- a) Varicela
- b) Rujeola
- c) Scarlatina
- d) Rubeola
- e) Tularemia

615. Intrebarea nr. 615: I626 **Capitol:** infectii eruptive **Mod de punctare:** A3 **Grad de dificultate:** mediu
Punctajul: 10 **Timp pe intrebare:** 0 sec **Autor:** poting

Eruptiile maculopapuloase sunt prezente in infectiile:

- a) Febra tifoida
- b) Rujeola
- c) Scarlatina
- d) Antrax
- e) Borreliaza